

## Antitumoralt läkemedel

Licenspreparat

## Trofosamid Peroral tablett

ATC-kod: L01AA07

BASFakta

## Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Peroral

## Anvisningar

## Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Licenspreparat Ixoten Baxter 50 mg finns.

## Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd)<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

## Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Hematologisk toxicitet</b>		
Leukopeni förekommer. Anemi och trombocytopeni har rapporterats.		
Dosjustering eller kortvarigt uppehåll av behandlingen vid uttalad leukopeni eller trombocytopeni.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b>		
Illamående och kräkning förekommer.		
Eventuellt dosjusteringsbehov, kortvarigt uppehåll i behandlingen alternativt antiemetikabehandling.		
<b>Hudtoxicitet</b>		
Håravfall förekommer.		
<b>Immunologisk reaktion</b>		
Överkänslighetsreaktioner har rapporterats. Hudreaktioner.		
<b>Övrigt</b>		
Cystit/urinblåsirritation inkluderande blod i urin har rapporterats. Framför allt vid höga doser och högrisk patienter så som tidigare strålbehandling mot bäcken, tidigare cystiter av cyklofosamid, ifosamid eller trofosamidbehandling eller njurvägsbekymmer i anamnesen.		
<b>CNS påverkan</b>		
Yrsel, trötthet/utmattning finns omnämnt. Neuropati mycket ovanligt.		
<b>Övrigt</b>		
Fallrapporter om sekundära maligniteter och förstadier till maligniteter. Dock ej helt säkerställt orsakssamband.		

## Versionsförändringar

## Version 1.3

Lagt till handhavandeinfo.

## Version 1.2

Lagt till information om att det är licenspreparat.

## Version 1.1

tom rad borttagen och ändrat från egennamn till substans ang cyklofosamid, ifosamid vid njurvägsproblem "övrigt"

## Version 1.0

Basfaktan fastställdes.