

Antitumoralt läkemedel

Vinblastin Intravenös infusion

BASFakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Kroppsyta	Maxdos per administrationstillfälle:	18,5 mg/m ²
Enhet för grunddos:	mg/m ²		
Administreringsväg:	Intravenös		

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Rekommenderad maxdos till barn 12,5 mg/m².

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Kan blandas med Doxorubicin. Se referens.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Hållbarhet efter spädning
72 timmar

Förvaring
Rumstemperatur

Spädningsanvisningar

Späd med 10 ml natriumklorid 9 mg/ml, ger styrka 1 mg/ml. Späd sedan vidare.

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi		
Neuropati	Biverkningskontroll	
Både akut övergående neuropati och risk för kumulativ bestående neurotoxicitet.		
Starkt vävnadsretande		
Levertoxicitet		
Vid nedsatt leverfunktion eventuell dosreduktion, se FASS alternativt respektive vårdprogram.		
Gastrointestinal påverkan		
Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder.		