Antitumoralt läkemedel

Vinblastin Intravenös injektion

ATC-kod: L01CA01

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m^2
Administreringsväg: Intravenös

Maxdos per administrationstillfälle: 18,5 mg/m^2

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration
Maxdos per administreringstillfälle för barn 12,5 mg/m2.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar
Späd med 10 ml natriumklorid 9 mg/ml, ger styrka 1 mg/ml.

Hållbarhet efter spädning
8 dygn

Förvaring
Rumstemperatur

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi		
Neuropati	Biverkningskontroll	
Både akut övergående neuropati och risk för kumulativ bestående neurotoxicitet.		
Starkt vävnadsretande		
Levertoxicitet		
Vid nedsatt leverfunktion eventuell dosreduktion, se FASS alternativt respektive vårdprogram.		
Gastrointestinal påverkan		
Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder.		

Versionsförändringar

Version 1.0
Vinblastin ska endast ges som infusion, därför arkiveras denna. (arkiverad)