

## Antitumoralt läkemedel

## Vinblastin Intravenös injektion

ATC-kod: L01CA01

BASFakta

## Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Kroppsyta	Maxdos per administrationstillfälle:	18,5 mg/m <sup>2</sup>
Enhet för grunddos:	mg/m <sup>2</sup>		
Administreringsväg:	Intravenös		

## Anvisningar

## Anvisningar för läkemedelsadministration

Maxdos per administreringstillfälle för barn 12,5 mg/m<sup>2</sup>.

## Spädningsinformation

## Spädningsanvisningar

Späd med 10 ml natriumklorid 9 mg/ml, ger styrka 1 mg/ml.

Hållbarhet efter spädning  
8 dygnFörvaring  
Rumstemperatur

## Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Akut infusionsreaktion/anafylaxi</b>		
<b>Neuropati</b>	Biverkningskontroll	
Både akut övergående neuropati och risk för kumulativ bestående neurotoxicitet.		
<b>Starkt vävnadsretande</b>		
<b>Levertoxicitet</b>		
Vid nedsatt leverfunktion eventuell dosreduktion, se FASS alternativt respektive vårdprogram.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b>		
Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder.		

## Versionsförändringar

## Version 1.0

Vinblastin ska endast ges som infusion, därför arkiveras denna. (arkiverad)