

## Antitumoralt läkemedel

# Vinkristin Bärbar infusionspump Intravenös infusion

ATC-kod: L01CA02

BASFakta

## Doseringsaspekter

<b>Beräkningssätt:</b>	Kroppsyta	<b>Maxdos per</b>	
<b>Enhet för grunddos:</b>	mg/m <sup>2</sup>	<b>administrationstillfälle:</b>	2 mg
<b>Administreringsväg:</b>	Intravenös		

## Anvisningar

### Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

#### Handhavande

Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd)<https://cancercentrum.se/download/18.4b2c14a019545e36ca725099/1742298635703/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf>

## Spädningsinformation

### Spädningsanvisningar

Pumpar för olika antal dygn och olika dos ger olika volym, se anvisningar för respektive pump.

Hållbarhet enligt pumptillverkarens uppgifter och efter antal dygn pumpen avses användas.

Förvaring i rumstemperatur.

## Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
-------------	----------	----------------------

### Akut infusionsreaktion/anafylaxi

Bronkospasm, andnöd finns rapporterat. Framför allt risk vid kombination med mitomycin.

### Gastrointestinal påverkan

Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder.

### Neuropati

Både akut övergående neuropati (motorisk och sensorisk) och risk för kumulativ bestående neurotoxicitet. Försiktighet vid redan känd neurologisk sjukdom. Fallrapporter finns om svåra neurologiska symtom efter enstaka doser hos personer med exempelvis Charcot-Marie-Tooth (även att neurologisk diagnos uppenbarats efter behandlingsstart vinkristin). Försiktighet även vid känd leverskada, då toxicitetsgrad kan öka.

### Starkt vävnadsretande

Lösningen är frätande. Endast för intravenös användning, i infusionspåse, aldrig injektionsspruta p.g.a. förväxlingsrisk. Fatal vid intratekal administrering, se FASS.

### Extravasering

#### Röd

Värme

Hyaluronidas

Vävnadstoxisk, risk för nekros (hög risk för vävnadsskada).

Central infart rekommenderas.

Räknas som vesicant non DNA binding. Tillhör vinkaalkaloider.

Följ instruktionen för värmebehandling, se stöddokument Extravasering.

Överväg lokal behandling med Hyaluronidas.

### Interaktionsbenägen substans

## Versionsförändringar

**Version 1.4**

Lagt till handhavandeinfo.

**Version 1.3**

interaktioner tillagd

**Version 1.2**

extravasering röd

**Version 1.1**

uppdaterad inför barn kryss iv inf

**Version 1.0**

Basfaktan fastställdes.