

Läkemedel

Zoledronsyra (vattenfri) Intravenös infusion

ATC-kod: M05BA08

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intravenös

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges som intravenös infusion under minst 20 min.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande:

Läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering pga fosterskadande risk, <https://cancercentrum.se/contentassets/59704405fb4645a7918481e5c9976e7c/handhavande-cancerlakemedel-riskanalys-1701.pdf> och läkemedlets skyddsinformation.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Glukos 50 mg/ml

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Önskad dos sättes till infusionspåsen.

Inkompatibelt med kalciumjoner.

Hållbarhet efter spädning

24 timmar (Natriumklorid 9 mg/ml)

24 timmar (Glukos 50 mg/ml)

Förvaring

Kallt

Kallt

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Övrigt Akutfas reaktion (eller post dos symptom) är influensaliknande symptom (feber, muskelvärk, huvudvärk, smärta extremiteter, illamående och ledvärk). Vanliga, övergående oftast på 3 dagar, men kan hålla i sig 7-14 dagar.	Biverkningskontroll	Paracetamol
Elektrolytrubbning Elektrolytrubbningar förekommer. Hypokalcemi beskrivs som övergående, kan bli uttalad.	Elektrolyter	
Hjärttoxicitet Rytmrubbningar (inklusive förmaksflimmer) finns rapporterat, dock ovanligt, eventuellt samband med elektrolytrubbning.		
Njurtoxicitet Minskad njurfunktion förekommer. Ökad risk för njurskada vid dehydrering, sedan tidigare nedsatt njurfunktion, upprepade behandlingscykler, andra nefrotoxiska läkemedel och kortare infusionstid än rekommenderat.	Njurfunktion	
Övrigt Osteonekros ovanligt. Placering käke, yttre hörselgången, höft, lårben omnämnda. Vid osteonekros i käke anges ökad risk vid tandextraktion eller andra tandkirurgiska ingrepp.		