

## Läkemedel

## Zoledronsyra (vattenfri) Intravenös infusion

ATC-kod: M05BA08

## Basfakta

## Doseringsaspekter

Beräkningsätt:	Standarddos
Enhet för grunddos:	mg
Administreringsväg:	Intravenös

## Anvisningar

## Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges som intravenös infusion under minst 20 min.

## Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

## Handhavande:

Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering pga fosterskadande risk.

Skyddsnivå baseras på riskanalys speciellt med hänsyn till gravida medarbetare och hur ofta läkemedlet hanteras på enheten.

## Spädningsinformation

## Spädningsvätska

100 ml Glukos 50 mg/ml

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

## Spädningsanvisningar

Önskad dos sättes till infusionspåsen.

Inkompatibelt med kalciumjoner.

## Hållbarhet efter spädning

24 timmar (Natriumklorid 9 mg/ml)

24 timmar (Glukos 50 mg/ml)

## Förvaring

Kallt

Kallt

## Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Övrigt</b> Akutfas reaktion (eller post dos symptom) är influensaliknande symtom (feber, muskelvärk, huvudvärk, smärta extremiteter, illamående och ledvärk). Vanliga, övergående oftast på 3 dagar, men kan hålla i sig 7-14 dagar.	Biverkningskontroll	Paracetamol
<b>Elektrolytrubbning</b> Elektrolytrubbningar förekommer. Hypokalcemi beskrivs som övergående, kan bli uttalad.	Elektrolyter	
<b>Hjärttoxicitet</b> Rytmrubbningar (inklusive förmaksflimmer) finns rapporterat, dock ovanligt, eventuellt samband med elektrolytrubbning.		
<b>Njurtoxicitet</b> Minskad njurfunktion förekommer. Ökad risk för njurskada vid dehydrering, sedan tidigare nedsatt njurfunktion, upprepade behandlingscykler, andra nefrotoxiska läkemedel och kortare infusionstid än rekommenderat.	Njurfunktion	
<b>Övrigt</b> Osteonekros förekommer, risk ökar vid samtidig cancersjukdom, kemoterapi, angiogeneshämmande behandling, strålbehandling, systemiska kortikosteroider. Det betyder att risken är högre i cancerbehandlingsgssammanhang än vid vanlig osteoporosbehandling. Riskökningen vid tandextraktioner eller andra tandkirurgiska ingrepp, rökning, anemi och infektion gäller också. Osteonekros i käke mest omtalad, finns även omnämnd placering i yttre hörselgång, höft och lårben.	Biverkningskontroll	

## Versionsförändringar

## Version 1.2

Ökad risk vid cancerbehandling än osteoporosbehandling. Utökad text./JP

**Version 1.1**

Justerat information om handhavande efter återkoppling och diskussion med NAG-handhavande cancerläkemedel.

**Version 1.0**

Basfaktan fastställdes.