Läkemedel

Zoledronsyra (vattenfri) Intravenös infusion

ATC-kod: M05BA08

Basfakta

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: Standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisningar

Anvisningar för läkemedelsadministration
Ges som intravenös infusion under minst 20 min.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration
Handhavande:

Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering pga fosterskadande risk.

Skyddsnivå baseras på riskanalys speciellt med hänsyn till gravida medarbetare och hur ofta läkemedlet hanteras på enheten.

Spädningsinformation

Spädningsvätska
100 ml Glukos 50 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar
Önskad dos sättes till infusionspåsen.
Inkompatibelt med kalciumjoner.

Hållbarhet efter spädning	Förvaring
24 timmar (Natriumklorid 9 mg/ml)	Kallt
24 timmar (Glukos 50 mg/ml)	Kallt

Biverkningar

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Övrigt	Biverkningskontroll	Paracetamol
Akutfas reaktion (eller post dos symptom) är influensaliknande symtom (feber, muskelvärk, huvudvärk, smärta extremiteter, illamående och ledvärk). Vanliga, övergående oftast på 3 dagar, men kan hålla i sig 7-14 dagar.		
Elektrolytrubbning	Elektrolyter	
Elektrolytrubbningar förekommer. Hypokalcemi beskrivs som övergående, kan bli uttalad.		
Hjärttoxicitet		
Rytmrubbningar (inklusive förmaksflimmer) finns rapporterat, dock ovanligt, eventuellt samband med elektrolytrubbning.		
Njurtoxicitet	Njurfunktion	
Minskad njurfunktion förekommer. Ökad risk för njurskada vid dehydrering, sedan tidigare nedsatt njurfunktion, upprepade vehandlingscykler, andra nefrotoxiska läkemedel och kortare infusionstid än rekommenderat.		
Övrigt	Biverkningskontroll	
Osteonekros förekommer, risk ökar vid samtidig cancersjukdom, kemoterapi, angiogeneshämmarbehandling, strålbehandling, systemiska kortikosteroider. Det betyder att risken är högre i cancerbehandlinsgssammanhang än vid vanlig osteoporosbehandling. Riskökningen vid tandextraktioner eller andra tandkirurgiska ingrepp, rökning, anemi och infektion gäller också. Osteonekros i käke mest omtalad, finns även omnämnd placering i yttre hörselgång, höft och lårben.		
Ögonpåverkan		
Konjunktivit förekommer. Irit och uveit finns rapporterat.		

Versionsförändringar

Version 1.3
Tillagd text om ögonpåverkan.

Version 1.2
Ökad risk vid cancerbehandling än osteoporosbehandling. Utökad text./JP

Version 1.1
Justerat information om handhavande efter återkoppling och diskussion med NAG-handhavande cancerläkemedel.

Version 1.0
Basfaktan fastställdes.