

Primära kutana B-cellslymfom

Patientinformation

Definition	Primära kutana B-cellslymfom är en grupp av lymfom där sjukdomen uppstår i hudens B-lymfocyter. De finns tre olika varianter av kutana B-cellslymfom: • primärt kutant marginalzonslymfom (PCMZL) • primärt kutant follikelcenterlymfom (PCFCL) • primärt kutant diffust storcelligt B-cellslymfom av leg-typ (PCLBCL-LT).
Symtom	PCMZL och PCFCL yttrar sig ofta som en långsamväxande rödaktig knuta eller ett hudutslag, som vanligen sitter på övre delen av kroppen. Vid PCLBCL-LT uppstår snabbväxande tumörer i huden, typiskt på benen, men de kan uppstå på andra ställen på kroppen. Den här sjukdomen drabbar oftast äldre kvinnor.
Diagnos	Diagnosen fastställs med hjälp av ett vävnadsprov (hudbiopsi). Ytterligare utredning med blodprover, datortomografi och ibland även benmärgsbiopsi behövs för att säkerställa att sjukdomen bara finns i huden.
Behandling	Vid fåtal avgränsade PCMZL och PCFCL är operation eller strålbehandling bra behandlingsalternativ. Det förekommer att sjukdomarna kan läka spontant. Om sjukdomarna är mer utbredda kan man behandla med antikroppsbehandling. Vid PCLBCL-LT rekommenderas i första hand antikroppsbehandling tillsammans med cellgifter, och ibland ges även strålbehandling.
Prognos	PCMZL och PCFCL har mycket god prognos. I vissa fall återkommer sjukdomen i huden och då kan man ge ny behandling. Prognosen vid PCLBCL-LT är sämre, men är svår att ange för den enskilda patienten.

Filmer om hudlymfom på Blodcancerförbundets hemsida:

[Lymfom](#) | [Blodcancerförbundet](#)