

Amsakrin

Så fungerar medicinen

Amsakrin gör att cancercellerna har svårare att dela sig och bli fler. När cancercellerna inte kan dela sig kommer de att förstöras.

Medicinen används för att behandla leukemi, alltså blodcancer.

Så får du medicinen

Du får medicinen som dropp direkt i blodet.

Biverkningar du kan få

- Du kan må illa och kräkas.
- Du kan bli lös i magen och få ont i magen.
- Du kan få blod i kisset.
- Du kan få små upphöjda blåmärken som kallas purpura.
- Du kan få humörsvängningar, till exempel bli irriterad eller ledsen.
- Du kan få lågt blodtryck. Det kan göra att du blir yr eller svimmar.
- Du kan få kramper. Det innebär att musklerna rycker och rör sig utan att du kan styra dem.
- Du kan få för lite kalium i kroppen. Det märker du oftast inte själv men vårdpersonalen kan se det på dina prover.
- Levern kan påverkas. Det kan leda till gulsot, alltså att huden och ögonvitorna blir gula. Kisset kan också bli mörkt, du kan bli trött, du kan må illa och det kan klia på kroppen.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen kan göra att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar.

Viktigt att veta

Hjärtat undersöks med ultraljud

Medicinen kan påverka hjärtat. Därför undersöks ditt hjärta med ultraljud före, under och efter behandlingen.

Du kan behöva röda blodkroppar eller blodplättar

Du kan behöva få dropp med röda blodkroppar eller blodplättar. Att få röda blodkroppar kallas blodtransfusion. Att få blodplättar kallas trombocytttransfusion.

Du kan behöva antibiotika om du får feber

Vita blodkroppar går inte att ersätta på samma sätt som röda blodkroppar och blodplättar. Oftast måste man vänta tills kroppen hinner återhämta sig och börjar bilda nya vita blodkroppar. Under tiden kan du behöva få antibiotika om du får feber, för att hjälpa kroppen att ta bort eventuella bakterier.