

Bevacizumab

Så fungerar medicinen

Bevacizumab gör att det inte bildas nya blodkärl i tumören. Därför får tumören svårare att växa.

Medicinen används för att behandla cancer i det centrala nervsystemet.

Så får du medicinen

Du får medicinen som dropp direkt i blodet.

Första gången tar det 90 minuter eftersom vårdpersonalen behöver kontrollera att du inte får allergiska reaktioner. Om det går bra kan det gå snabbare nästa gång.

Biverkningar du kan få

- Du kan bli lös i magen och få ont i magen.
- Du kan få ont i huvudet.
- Du kan bli mindre hungrig.
- Du kan få högt blodtryck. Därför kontrolleras blodtrycket regelbundet under behandlingen. Ibland kan du behöva medicin för att sänka blodtrycket.
- Du kan få allergiska reaktioner. Lätta allergiska reaktioner kan bland annat göra att det kliar på kroppen. Svåra allergiska reaktioner kan bland annat göra att blodtrycket sjunker, hjärtat slår snabbare och halsen svullnar.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen kan göra att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar.

Viktigt att veta

Du får hjälp vid en allergisk reaktion

Du behöver stanna kvar på sjukhuset cirka 1–3 timmar efter att du har fått medicinen. Då kan du få hjälp om du skulle få en allergisk reaktion.

Du kan behöva röda blodkroppar eller blodplättar

Du kan behöva få dropp med röda blodkroppar eller blodplättar. Att få röda blodkroppar kallas blodtransfusion. Att få blodplättar kallas trombocyttransfusion.

Du kan behöva antibiotika om du får feber

Vita blodkroppar går inte att ersätta på samma sätt som röda blodkroppar och blodplättar. Oftast måste man vänta tills kroppen hinner återhämta sig och börjar bilda nya vita blodkroppar. Under tiden kan du behöva få antibiotika om du får feber, för att hjälpa kroppen att ta bort eventuella bakterier.