

Cisplatin

Så fungerar medicinen

Cisplatin gör att cancercellerna har svårare att dela sig och bli fler. När cancercellerna inte kan dela sig kommer de att förstöras.

Medicinen används för att behandla olika typer av cancer hos barn.

Så får du medicinen

Du får medicinen som dropp direkt i blodet. Det kan ta mellan 6 och 72 timmar beroende på din diagnos och det behandlingsprotokoll du följer.

Biverkningar du kan få

- Du kan må illa och kräkas.
- Du kan bli lös eller hård i magen.
- Du kan tappa håret. Det kommer oftast tillbaka efter behandlingen. Ditt nya hår kan vara annorlunda, till exempel ha en annan färg eller vara lockigt om det tidigare var rakt.
- Du kan få allergiska reaktioner. Lätta allergiska reaktioner kan bland annat göra att det kliar på kroppen. Svåra allergiska reaktioner kan bland annat göra att blodtrycket sjunker, hjärtat slår snabbare och halsen svullnar.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen kan göra att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar.
- Du kan höra sämre. Det kan också ringa i öronen, så kallad tinnitus.
- Njurarna kan påverkas så att de fungerar sämre. Då tar det längre tid för dem att rena blodet från ämnen som inte behövs i kroppen.

Viktigt att veta

Vätska som dropp skyddar njurarna och minskar illamående

Du får vätska som dropp för att minska risken att njurarna påverkas och att du mår illa. Därför fortsätter droppet i några timmar efter att du har fått cancermedicinen.

Du får medicin mot illamående

Innan du får cisplatin får du medicin mot illamående. Den behandlingen fortsätter några dagar efter att du har fått cisplatin. Om du fortsätter att må illa kan du få mer medicin som du tar själv när du behöver.

Hörseln och njurarna kontrolleras

Medicinen kan påverka hörseln och njurarna. Därför kontrolleras din hörsel och hur njurarna fungerar före, under och efter behandlingen.

Du kan behöva röda blodkroppar eller blodplättar

Du kan behöva få dropp med röda blodkroppar eller blodplättar. Att få röda blodkroppar kallas blodtransfusion. Att få blodplättar kallas trombocyttransfusion.

Du kan behöva antibiotika om du får feber

Vita blodkroppar går inte att ersätta på samma sätt som röda blodkroppar och blodplättar. Oftast måste man vänta tills kroppen hinner återhämta sig och börjar bilda nya vita blodkroppar. Under tiden kan du behöva få antibiotika om du får feber, för att hjälpa kroppen att ta bort eventuella bakterier.