

Cyklofosfamid

Så fungerar medicinen

Cyklofosfamid gör att cancercellerna har svårare att dela sig och bli fler. När cancercellerna inte kan dela sig kommer de att förstöras.

Medicinen används för att behandla olika typer av cancer hos barn.

Så får du medicinen

Du får medicinen på något av dessa sätt:

- Dropp direkt i blodet.
- Tabletter.
- Vätska att dricka.

Biverkningar du kan få

- Du kan må illa och kräkas.
- Du kan få blod i kisset.
- Du kan tappa håret. Det kommer oftast tillbaka efter behandlingen. Ditt nya hår kan vara annorlunda, till exempel ha en annan färg eller vara lockigt om det tidigare var rakt.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen gör att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar kan minska.

Viktigt att veta

Medicin och vätska skyddar urinblåsan

Cyklofosfamid kan påverka slemhinnan i urinblåsan. Därför får du även medicinen Uromitexan när du får cyklofosfamid som dropp. Medicinen skyddar urinblåsan.

När du får cyklofosfamid som dropp får du även annan vätska som dropp eller dryck. Det hjälper till att skölja och skydda urinblåsan.

Du får också lämna kissprov. Vårdpersonalen kontrollerar kisset med en sticka. Då kan de upptäcka om urinblåsan är irriterad och du kan få behandling mot det.

Du kan behöva röda blodkroppar eller blodplättar

Du kan behöva få dropp med röda blodkroppar eller blodplättar. Att få röda blodkroppar kallas blodtransfusion. Att få blodplättar kallas trombocytttransfusion.

Du kan behöva antibiotika om du får feber

Vita blodkroppar går inte att ersätta på samma sätt som röda blodkroppar och blodplättar. Oftast måste man vänta tills kroppen hinner återhämta sig och börjar bilda nya vita blodkroppar. Under tiden kan du behöva få antibiotika om du får feber, för att hjälpa kroppen att ta bort eventuella bakterier.