

Daunorubicin

Så fungerar medicinen

Daunorubicin gör att cancercellerna har svårare att dela sig och bli fler. När cancercellerna inte kan dela sig kommer de att förstöras.

Medicinen används för att behandla olika typer av cancer hos barn.

Så får du medicinen

Du får medicinen som dropp direkt i blodet.

Biverkningar du kan få

- Du kan må illa, kräkas och bli lös i magen.
- Du kan få blåsor och sår i munnen.
- Du kan få utslag och bli röd på huden.
- Du kan tappa håret. Det kommer oftast tillbaka efter behandlingen. Ditt nya hår kan vara annorlunda, till exempel ha en annan färg eller vara lockigt om det tidigare var rakt.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen kan göra att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar.

Viktigt att veta

Kisset kan bli rött

Medicinen är röd, och därför kan kisset bli rött. Det försvinner cirka ett dygn efter att du har fått sista dosen av medicinen.

Hjärtat undersöks med ultraljud

Medicinen kan påverka hjärtat. Därför undersöks ditt hjärta med ultraljud före, under och efter behandlingen.

Du kan behöva röda blodkroppar eller blodplättar

Du kan behöva få dropp med röda blodkroppar eller blodplättar. Att få röda blodkroppar kallas blodtransfusion. Att få blodplättar kallas trombocytttransfusion.

Du kan behöva antibiotika om du får feber

Vita blodkroppar går inte att ersätta på samma sätt som röda blodkroppar och blodplättar. Oftast måste man vänta tills kroppen hinner återhämta sig och börjar bilda nya vita blodkroppar. Under tiden kan du behöva få antibiotika om du får feber, för att hjälpa kroppen att ta bort eventuella bakterier.