

Dinutuximab beta

Så fungerar medicinen

Dinutuximab beta gör att immunförsvaret kan attackera och förstöra cancerceller.

Medicinen används för att behandla neuroblastom hos barn. Det är en typ av cancer som börjar växa i nervceller, oftast i magen nära njurarna.

Så får du medicinen

Du får medicinen som dropp direkt i blodet utan uppehåll i 7–10 dygn.

Biverkningar du kan få

- Du kan må illa och kräkas.
- Du kan bli lös eller hård i magen.
- Du kan få feber och frossa.
- Du kan få ont i huvudet och andra delar av kroppen.
- Du kan bli mer känslig för ljus och svullen runt ögonen.
- Du kan få domningar, stickningar, sämre känsel, känna dig svag eller att det bränner i händerna, fötterna, armarna och benen. Det beror på att nerverna kan påverkas.
- Du kan bli svullen i armarna, benen och andra delar av kroppen. Det beror på att det kan läcka blod från små blodkärl. Vårdpersonalen kontrollerar detta under tiden du får droppet, så att du kan få behandling mot det.
- Du kan få allergiska reaktioner. Lätta allergiska reaktioner kan bland annat göra att det kliar på kroppen. Svåra allergiska reaktioner kan bland annat göra att blodtrycket sjunker, hjärtat slår snabbare och halsen svullnar.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen kan göra att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar.

Viktigt att veta

Du får medicin mot biverkningar

Före behandlingen får du medicin som minskar risken för biverkningar. Du får också smärtlindring 3 dagar innan behandlingen startar och fortsatt under behandlingen.

Kontroller före och under behandlingen

Före och under behandlingen kontrollerar vårdpersonalen din puls, ditt blodtryck och hur mycket syre som finns i blodet. Kontrollerna under behandlingen görs oftare i början och sedan mer sällan.