

Gemcitabin

Så fungerar medicinen

Gemcitabin gör att cancercellerna har svårare att dela sig och bli fler. När cancercellerna inte kan dela sig kommer de att förstöras.

Medicinen används för att behandla olika typer av cancer hos barn.

Så får du medicinen

Du får medicinen som dropp direkt i blodet.

Biverkningar du kan få

- Du kan må illa och kräkas.
- Du kan få utslag på huden och det kan klia på kroppen.
- Du kan bli mindre hungrig.
- Du kan få blåsor och sår i slemhinnorna i munnen, matstrupen, magsäcken och tarmarna.
- Sömnen kan störas och du kan känna dig trött.
- Du kan få blod i kisset.
- Det kan kännas som att du har influensa. Du kan till exempel få feber, frossa och ont i musklerna. Du kan också få ont i huvudet, hosta och bli snuvig och andfådd.
- Levern kan påverkas. Det kan leda till gulsot, alltså att huden och ögonvitorna blir gula. Kisset kan också bli mörkt, du kan bli trött, du kan må illa och det kan klia på kroppen.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen kan göra att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar.

Viktigt att veta

Du kan behöva röda blodkroppar eller blodplättar

Du kan behöva få dropp med röda blodkroppar eller blodplättar. Att få röda blodkroppar kallas blodtransfusion. Att få blodplättar kallas trombocyttransfusion.

Du kan behöva antibiotika om du får feber

Vita blodkroppar går inte att ersätta på samma sätt som röda blodkroppar och blodplättar. Oftast måste man vänta tills kroppen hinner återhämta sig och börjar bilda nya vita blodkroppar. Under tiden kan du behöva få antibiotika om du får feber, för att hjälpa kroppen att ta bort eventuella bakterier.

Gemcitabin

Fastställt 2025-10-20, uppdaterad 2026-01-09

Sida 1 av 1