

# Imatinib

## Så fungerar medicinen

Imatinib söker upp cancercellerna och förstör dem. Det kallas målriktad behandling.

Medicinen används för att behandla olika typer av cancer hos barn.

## Så får du medicinen

Du får medicinen som tabletter.

Ta helst tabletten i samband med en måltid – det skyddar mot magproblem.

Om du har svårt att svälja tabletten kan du lösa upp den i vatten (inte kolsyrat) eller äppeljuice. Rör med en sked tills tabletten har löst sig helt. Då ska du dricka upp allt på en gång.

## Biverkningar du kan få

- Du kan må illa och kräkas.
- Du kan bli lös i magen och få ont i magen.
- Du kan få utslag på huden.
- Du kan bli svullen runt lederna och ögonen.
- Du kan få ont i huvudet, kramp i musklerna och ont i lederna, musklerna eller skelettet.
- Kroppen kan samla på sig vätska så att du går upp i vikt. Det är därför bra om du väger dig regelbundet under den första månaden du tar medicinen. Du kommer också att få väga dig vid läkarbesök.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen kan göra att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar.