

Inotuzumabozogamicin (Besponsa)

Så fungerar medicinen

Inotuzumabozogamicin söker upp cancercellerna och förstör dem. Det kallas målriktad behandling.

Medicinen används för att behandla leukemi, alltså blodcancer. Den kan också användas före en transplantation av stamceller.

Så får du medicinen

Du får medicinen som dropp direkt i blodet. Det tar en timme.

Biverkningar du kan få

- Du kan må illa och kräkas.
- Du kan bli lös eller hård i magen.
- Du kan få ont i huvudet.
- Du kan känna dig mindre hungrig.
- Du kan få allergiska reaktioner. Lätta allergiska reaktioner kan bland annat göra att det kliar på kroppen. Svåra allergiska reaktioner kan bland annat göra att blodtrycket sjunker, hjärtat slår snabbare och halsen svullnar.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen kan göra att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar.

Viktigt att veta

Före behandlingen får du medicin som minskar risken för allergiska reaktioner. Du behöver också stanna kvar på sjukhuset 1–3 timmar efter att du har fått droppet. Då kan du få hjälp om du skulle få en allergisk reaktion.