

Karboplatin

Så fungerar medicinen

Karboplatin gör att cancercellerna har svårare att dela sig och bli fler. När cancercellerna inte kan dela sig kommer de att förstöras.

Medicinen används för att behandla olika typer av cancer hos barn.

Så får du medicinen

Du får medicinen som dropp direkt i blodet.

Biverkningar du kan få

- Du kan må illa, kräkas och bli lös i magen.
- Du kan få blåsor och sår i munnen.
- Du kan tappa håret. Det kommer oftast tillbaka efter behandlingen. Ditt nya hår kan vara annorlunda, till exempel ha en annan färg eller vara lockigt om det tidigare var rakt.
- Du kan höra sämre. Det kan också ringa i öronen, så kallad tinnitus.
- Njurarna kan påverkas så att de fungerar sämre. Då tar det längre tid för dem att rena blodet från ämnen som inte behövs i kroppen.
- Du kan få allergiska reaktioner. Lätta allergiska reaktioner kan bland annat göra att det kliar på kroppen. Svåra allergiska reaktioner kan bland annat göra att blodtrycket sjunker, hjärtat slår snabbare och halsen svullnar.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen kan göra att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar.

Viktigt att veta

Vätska som dropp skyddar njurarna och minskar illamående

Du får vätska som dropp för att minska risken att njurarna påverkas och att du mår illa. Därför fortsätter droppet i några timmar efter att du har fått cancermedicinen.

Hörseln och njurarna kontrolleras

Medicinen kan påverka hörseln och njurarna. Därför kontrolleras din hörsel och hur njurarna fungerar före, under och efter behandlingen.

Du kan behöva röda blodkroppar eller blodplättar

Du kan behöva få dropp med röda blodkroppar eller blodplättar. Att få röda blodkroppar kallas blodtransfusion. Att få blodplättar kallas trombocytttransfusion.

Du kan behöva antibiotika om du får feber

Vita blodkroppar går inte att ersätta på samma sätt som röda blodkroppar och blodplättar. Oftast måste man vänta tills kroppen hinner återhämta sig och börjar bilda nya vita blodkroppar. Under tiden kan du behöva få antibiotika om du får feber, för att hjälpa kroppen att ta bort eventuella bakterier.