

Klofarabin

Så fungerar medicinen

Klofarabin gör att cancercellerna har svårare att dela sig och bli fler. När cancercellerna inte kan dela sig kommer de att förstöras.

Medicinen används för att behandla leukemi, alltså blodcancer.

Så får du medicinen

Du får medicinen som dropp direkt i blodet.

Biverkningar du kan få

- Du kan få ont i huvudet.
- Du kan få feber.
- Du kan bli trött.
- Du kan känna dig orolig.
- Du kan må illa, kräkas och bli lös i magen.
- Du kan få blåsor och sår i munnen.
- Huden kan bli röd, klia och bli inflammerad.
- Du kan få utslag som kan klia, göra ont och fjälla. Utslagen kan komma på huden, handflatorna och fotsulorna. Du kan också få små röda fläckar under huden.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen kan göra att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar.

Viktigt att veta

Du kan behöva röda blodkroppar eller blodplättar

Du kan behöva få dropp med röda blodkroppar eller blodplättar. Att få röda blodkroppar kallas blodtransfusion. Att få blodplättar kallas trombocytttransfusion.

Du kan behöva antibiotika om du får feber

Vita blodkroppar går inte att ersätta på samma sätt som röda blodkroppar och blodplättar. Oftast måste man vänta tills kroppen hinner återhämta sig och börjar bilda nya vita blodkroppar. Under tiden kan du behöva få antibiotika om du får feber, för att hjälpa kroppen att ta bort eventuella bakterier.