

Merkaptopurin (Puri-nethol, Purimmun och Xaluprine)

Så fungerar medicinen

Merkaptopurin gör att cancercellerna har svårare att dela sig och bli fler. När cancercellerna inte kan dela sig kommer de att förstöras.

Medicinen används för att behandla olika typer av cancer hos barn.

Så får du medicinen

Du får medicinen som tabletter eller vätska att dricka.

Du tar medicinen en gång per dag, oftast på kvällen. Det viktigaste är att du försöker ta den samma tid varje dag.

Merkaptopurin går bra att ta tillsammans med mejeriprodukter som mjölk eller yoghurt. Om du gör det, försök att göra på samma sätt varje dag.

Tabletterna går att dela och lösa upp i vatten eller saft. Prata med vårdpersonalen för att få veta hur du ska göra. Tabletterna ska inte krossas.

Biverkningar du kan få

- Du kan få lågt blodsocker på morgonen. Det kan göra att du mår illa och känner dig trött och irriterad. Då är det bra om du äter något för att höja blodsockret.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen kan göra att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar.

Viktigt att veta

Dosen kan ändras under behandlingen. Det beror på hur dina blodvärden är, hur du mår och om du får någon annan behandling samtidigt.