

Metotrexat som dropp

Så fungerar medicinen

Metotrexat gör att cancercellerna har svårare att dela sig och bli fler. När cancercellerna inte kan dela sig kommer de att förstöras.

Medicinen används för att behandla olika typer av cancer hos barn.

Så får du medicinen

Du får medicinen som dropp direkt i blodet.

Biverkningar du kan få

- Du kan må illa och kräkas.
- Du kan få blåsor och sår i munnen.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen kan göra att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar.

Viktigt att veta

Du får inte äta vissa mediciner

Före behandlingen får du inte äta medicinerna Bactrim, Nexium eller Omeprazol. De gör det svårare för kroppen att göra sig av med cancermedicinen. De kan också göra att man får mer biverkningar.

Vätska som dropp skyddar njurarna

Du får vätska som dropp för att skölja ut medicinen så att den inte skadar njurarna. Vårdpersonalen mäter därför hur mycket du kissar under behandlingen. De kontrollerar också hur dina njurar fungerar med blodprov före, under och efter behandlingen.

Kisset kan bli gulare än vanligt

Medicinen är gul, och därför kan kisset bli gulare än vanligt.

Du får vitaminet folsyra

Metotrexat tömmer kroppen på vitaminet folsyra. Därför kommer du att få folsyra regelbundet. Det ges oftast som en spruta.

Du kan behöva röda blodkroppar eller blodplättar

Du kan behöva få dropp med röda blodkroppar eller blodplättar. Att få röda blodkroppar kallas blodtransfusion. Att få blodplättar kallas trombocyttransfusion.

Du kan behöva antibiotika om du får feber

Vita blodkroppar går inte att ersätta på samma sätt som röda blodkroppar och blodplättar. Oftast måste man vänta tills kroppen hinner återhämta sig och börjar bilda nya vita blodkroppar. Under tiden kan du behöva få antibiotika om du får feber, för att hjälpa kroppen att ta bort eventuella bakterier.