

Akut Lymfatisk Leukemi Blinatumomab

Blinatumomab

Beskrivning

Ges framför allt vid akut lymfatisk leukemi (ALL) när tidigare behandlingar inte har fungerat eller har slutat fungera. Blinatumomab fungerar genom att göra det möjligt för immunsystemet att attackera och förstöra blodcancerceller.

Hur får barnet medicinen?

Läkemedlet ges som en kontinuerlig infusion (dropp) över 28 dygn. Före behandlingen ges premedicinering med bl.a. kortison för att minimera infusionsreaktioner och andra eventuella biverkningar. Behandlingen ges första veckan på avdelningen men om allt går bra kan resterande behandling ges i hemmet via en infusionspump.

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?

- Reaktionen förknippade med infusionen, till exempel feber, svullnad, frossbrytningar, sänkt eller förhöjt blodtryck och inflammation
- Sömnsvårigheter
- Huvudvärk, skakningar (tremor)
- Illamående, diarré, kräkningar, förstoppning, magont
- Utslag
- Ryggsmärta, smärta i armar och/eller ben
- Förhöjda levervärden

Läkemedlet kan påverka bildningen av röda och vita blodkroppar samt blodplättar så att dessa nivåer blir låga.

Allmän information om biverkningar

Biverkningarna kan med hjälp av den kunskap och de mediciner som finns idag ofta förebyggas, reduceras, och ibland helt försvinna. Kontakta alltid personalen om du får problem.