

Hjärntumör - Topotekan Temozolomid

Temozolomid

Beskrivning

Temozolomid används vid återfall av maligna gliom eller om tumören fortsätter att utvecklas efter standardbehandling.

Hur får barnet medicinen?

Temozolomid ges som kapslar som ska sväljas hela tillsammans med ett glas vatten. Ta kapslarna på fastande mage, t.ex. minst en timme innan frukost.

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?

Vanliga biverkningar kan vara aptitlöshet, talsvårigheter, huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, utslag, håravfall och trötthet.

Annan viktig information

Temozolomid är ett cytostatikum och man bör därför tänka på hanteringen av medicinen.

Topotekan

Beskrivning

Ges framför allt vid rhabdomyosarkom och neuroblastom. Läkemedlet hämmar tillväxt av cancercellerna genom att påverka DNAs förmåga att replikera sig och därmed cellen att dela sig.

Hur får barnet medicinen?

Behandlingen ges som infusion (dropp).

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?

- Illamående, kräkningar, diarré, magsmärta, förstoppning
- Påverkan på benmärgsfunktionen. Nybildning av blodkroppar och blodplättar påverkas. Neutropen feber
- Håravfall
- Viktminskning och aptitlöshet, trötthet, svaghet
- Inflammation och sår på tungan eller tandköttet

Allmän information om biverkningar

Biverkningarna kan med hjälp av den kunskap och de mediciner som finns idag ofta förebyggas, reduceras, och ibland helt försvinna. Kontakta alltid personalen om du får problem.