

## Höggradigt gliom - Lomustin Temozolomid

---

### Lomustine

#### Beskrivning

Lomustine ges till barn framförallt vid behandling av hjärntumörer (medulloblastom och höggradigt gliom).

#### Hur får barnet medicinen?

Lomustine är en kapsel som ska sväljas hel och gärna med minst ett halvt glas vatten och innan barnet ätit något. Vid svårighet att svälja kapslar kontakta vårdpersonal för vidare instruktioner.

Dosen kan behöva anpassas under behandlingens gång beroende blodvärden, barnets mående samt om barnet får annan behandling samtidigt.

#### Vilka vanligare biverkningar har medicinen?

- Illamående, kräkning
- Benmärghspåverkan - Läkemedlet kan påverka bildningen av röda och vita blodkroppar samt blodplättar så att dessa nivåer blir låga.

#### Annan viktig information

Lomustine är en cytostatika och ska hanteras med försiktighet. Undvik om möjligt att ta i kapseln, till exempel kan sked användas. Tvätta händerna efter hantering. Ska ej hanteras av gravida.

### Temozolomid

#### Beskrivning

Temozolomid används vid återfall av maligna gliom eller om tumören fortsätter att utvecklas efter standardbehandling.

#### Hur får barnet medicinen?

Temozolomid ges som kapslar som ska sväljas hela tillsammans med ett glas vatten. Ta kapslarna på fastande mage, t.ex. minst en timme innan frukost.

#### Vilka vanligare biverkningar har medicinen?

Vanliga biverkningar kan vara aptitlöshet, talsvårigheter, huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, utslag, håravfall och trötthet.

#### Annan viktig information

Temozolomid är ett cytostatikum och man bör därför tänka på hanteringen av medicinen.

### Allmän information om biverkningar

Biverkningarna kan med hjälp av den kunskap och de mediciner som finns idag ofta förebyggas, reduceras, och ibland helt försvinna. Kontakta alltid personalen om du får problem.