

Kronisk Myeloisk Leukemi

Imatinib

Beskrivning

Imatinib ges vid Philadelphia-kromosom-positiv akut lymfoblastisk leukemi (Ph-positiv ALL), ALL med vissa genförändringar och kronisk myeloisk leukemi (KML).

Hur får barnet medicinen?

Imatinib ges som tablett som bör tas i samband med måltid för att skydda mot magproblem. Vid sväljsvårigheter kan tabletterna lösas upp i ett glas icke kolsyrat vatten eller äppeljuice. Använd ca 50 ml för en 100 mg tablett eller 200 ml för en 400 mg tablett. Rör med en sked till tabletten har löst sig helt. När tabletterna är helt upplösta, ska hela innehållet drickas upp på en gång.

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?

Imatinib påverkar benmärgen genom att hämma nybildningen av blodkroppar med övergående minskning av antalet vita blodkroppar och blodplättar som följd. Detta ger ökad infektionskänslighet och kan orsaka trötthet och blödningar.

Imatinib kan göra så att kroppen samlar på sig vätska vilket kan leda till viktuppgång. Det är därför bra att väga barnet regelbundet under första månaden av behandlingen med imatinib.

Imatinib kan också orsaka huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré eller matsmältningsbesvär, hudutslag, muskelkramper eller smärta i leder, muskler eller skelett samt svullnad runt leder eller uppsvullna ögon.

Meddela läkare om något av detta påverkar barnet allvarligt.

Allmän information om biverkningar

Biverkningarna kan med hjälp av den kunskap och de mediciner som finns idag ofta förebyggas, reduceras, och ibland helt försvinna. Kontakta alltid personalen om du får problem.