

## Post-transplantationslymfom

---

### Rituximab

#### Beskrivning

Rituximab är en antikropp som verkar på B-celler, som är en typ av vit blodkropp, dessa celler deltar i immunförsvaret bland annat genom att bilda antikroppar (immunglobuliner).

#### Hur får barnet medicinen?

Ges som ett dropp (infusion), tiden varierar beroende på diagnos, behandlingsprotokoll och tolerans för läkemedlet. Det kan ges i din/ditt barns venport eller CVK, kan även ges i en perifer venkateter (PVK).

#### Vilka vanligare biverkningar har medicinen?

Under droppet (infusionen) kan en allergisk reaktion med klåda, retning i halsen, andnöd, feber, frossa, illamående/kräkning, huvudvärk, stigande eller sjunkande blodtryck uppstå. Denna reaktion är vanligast vid första behandlingen och uppkommer oftast under eller strax efter behandlingen. De flesta biverkningar kan förebyggas med allergimedicin, kortison och paracetamol. Dessa läkemedel ges innan start av droppet (infusionen). Ytterligare beredskap finns om en allvarig allergisk reaktion skulle uppträda.

#### Annan viktig information

Puls, blodtryck och syresättning kontrolleras före start av dropp(infusion) därefter med jämna mellanrum enligt ett särskilt schema.

Rituximab ger en långvarig påverkan även på de friska B-cellerna, vilket kan innebära en ökad infektionskänslighet efter avslutad behandling, detta följs och hanteras utifrån provsvar och eventuella symtom.

### Allmän information om biverkningar

Biverkningarna kan med hjälp av den kunskap och de mediciner som finns idag ofta förebyggas, reduceras, och ibland helt försvinna. Kontakta alltid personalen om du får problem.