

Pegaspargas

Så fungerar medicinen

Pegaspargas bryter ner ett ämne som både cancerceller och friska celler behöver. Cancercellerna kan inte bilda ämnet själva, men det kan friska celler göra. Därför skadar medicinen cancercellerna, men inte de friska cellerna.

Medicinen används för att behandla olika typer av cancer hos barn.

Så får du medicinen

Du får medicinen som en spruta eller som dropp direkt i blodet.

Biverkningar du kan få

- Du kan få allergiska reaktioner. Lätta allergiska reaktioner kan bland annat göra att det kliar på kroppen. Svåra allergiska reaktioner kan bland annat göra att blodtrycket sjunker, hjärtat slår snabbare och halsen svullnar.
- Du kan få ont i magen när du har ätit. Det kan bero på en inflammation i bukspottkörteln som kallas pankreatit.
- Levern kan påverkas. Det kan leda till gulsot, alltså att huden och ögonvitrorna blir gula. Kisset kan också bli mörkt, du kan bli trött, du kan må illa och det kan klia på kroppen.

Viktigt att veta

Du får hjälp vid en allergisk reaktion

Du behöver stanna kvar på sjukhuset cirka 1–3 timmar efter att du har fått medicinen. Då kan du få hjälp om du skulle få en allergisk reaktion.

Blodprover visar att medicinen fungerar

Du får lämna blodprover så att läkarna kan följa att medicinen fungerar och hur stor effekt den har. Proverna tas enligt ett schema. I början av behandlingen lämnar du blodprover lite oftare.