Tiotepa

Så fungerar medicinen

Tiotepa används för att förbereda kroppen inför en transplantation av stamceller. Det kallas konditionering.

Så får du medicinen

Du får medicinen som dropp direkt i blodet.

Biverkningar du kan få

- Du kan må illa och kräkas.
- Du kan bli lös i magen och få ont i magen.
- Du kan få blåsor och sår i slemhinnorna i munnen, matstrupen, magsäcken och tarmarna.
- Du kan få ont i huvudet och bli yr.
- Du kan få högt blodtryck. Därför kontrolleras blodtrycket regelbundet under behandlingen. Ibland behövs medicin för att sänka blodtrycket.
- Du kan få ont i musklerna och lederna.
- Du kan få blod i kisset.
- Levern kan påverkas. Det kan leda till gulsot, alltså att huden och ögonvitorna blir gula. Kisset kan också bli mörkt, du kan bli trött, du kan må illa och det kan klia på kroppen.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen kan göra att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar.

Viktigt att veta

Du kan behöva röda blodkroppar eller blodplättar

Du kan behöva få dropp med röda blodkroppar eller blodplättar. Att få röda blodkroppar kallas blodtransfusion. Att få blodplättar kallas trombocyttransfusion.

Du kan behöva antibiotika om du får feber

Vita blodkroppar går inte att ersätta på samma sätt som röda blodkroppar och blodplättar. Oftast måste man vänta tills kroppen hinner återhämta sig och börjar bilda nya vita blodkroppar. Under tiden kan du behöva få antibiotika om du får feber, för att hjälpa kroppen att ta bort eventuella bakterier.