

Vindesin

Så fungerar medicinen

Vindesin gör att cancercellerna har svårare att dela sig och bli fler. När cancercellerna inte kan dela sig kommer de att förstöras.

Medicinen används för att behandla olika typer av cancer hos barn.

Så får du medicinen

Du får medicinen som dropp direkt i blodet.

Biverkningar du kan få

- Du kan bli förstoppad, alltså hård i magen.
- Du kan bli mer känslig för infektioner, lättare få blåmärken och blödningar, och bli blek och trött. Det beror på att medicinen kan göra att dina röda och vita blodkroppar och blodplättar minskar.

Viktigt att veta

Medicin mot förstoppning kan hjälpa

För att hålla igång magen kan du få medicin mot förstoppning. Det finns olika alternativ där du och din läkare tillsammans kan försöka hitta det som passar dig bäst.

Du kan behöva röda blodkroppar eller blodplättar

Du kan behöva få dropp med röda blodkroppar eller blodplättar. Att få röda blodkroppar kallas blodtransfusion. Att få blodplättar kallas trombocyttransfusion.

Du kan behöva antibiotika om du får feber

Vita blodkroppar går inte att ersätta på samma sätt som röda blodkroppar och blodplättar. Oftast måste man vänta tills kroppen hinner återhämta sig och börjar bilda nya vita blodkroppar. Under tiden kan du behöva få antibiotika om du får feber, för att hjälpa kroppen att ta bort eventuella bakterier.