

Datum: _____
 Läkare: _____
 Kur nr: _____
 Längd (cm): _____ Vikt (kg): _____
 Yta (m²): _____ Aktuellt GFR: _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Äggstockscancer

RegimID: NRB-2962

Doxorubicin liposomalt -Trabektedin

Diagnoskod: C56

Kurintervall: 21 dagar

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
Doxorubicin Liposomalt Intravenös infusion 30 mg/m ² (kroppsyta)	x1																					
Trabektedin Intravenös infusion 1,1 mg/m ² (kroppsyta)	x1																					

Lågemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Ökad beredskap för anafylaktisk reaktion.

Doxorubicin liposomalt Första dosen ges på 2 timmar, därefter ges infusionen på 1 timme.**Glukos 50 mg/ml** används som infusionsvätska och i spoldropp under hela behandlingen. Doxorubicin liposomalt är inkompatibelt med Natriumklorid.

Kontroll av hand-fotsyndrom, stomatit.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blod-, leverstatus (bilirubin, ALP, ASAT, ALAT) och CK (kreatininfosfokinas).

Premedicinering - Betametason 16 mg ges peroralt eller som intravenös injektion 30 minuter före start (är också leverskyddande).

Dosjustering rekommendation

Reduktion av första kuren - Om tidigare högdos cytostatika (Ifosamid, Metotrexat eller med stamcellsstöd) eller strålbehandling till >25 % av benmärg - ge Trabektedin 1,0 mg/m².

Följande kurer:

Neutrofila <1,5 och/eller TPK <100 behandlingen skjuts upp en vecka.

Nadirvärden i >5 dagar, neutrofila <0,5 och/eller TPK <25 - sänk doserna en nivå, se nedan.

Nadirvärden i >3 dagar, neutrofila ≤ 0,1, sänk doserna en nivå.

Febril neutropeni (≥ 38 C och neutrofila ≤1,0) - sänk doserna en nivå.

Hand-fotsyndrom, illamående, stomatit, se FASS - sänk en nivå för Doxorubicin liposomalt.

Levervärden, bilirubin och ALP ≥2 - sänk en nivå för Trabektedin.

Levervärden, ALAT/ASAT ≥3 - sänk doserna en nivå.

Dosnivåer

Nivå 0 - Doxorubicin liposomalt 30 mg/m², Trabektedin 1,1 mg/m²

Nivå -1 - 80 % för båda läkemedlen.

Nivå -2 - 67 % för båda läkemedlen.

Antiemetika

Förslag enligt stöddokument:

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/stoddokument/antiemetika-vuxen/#chapter-Antiemetikaregim-1-dag->

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. 500 ml Glukos 50 mg/ml <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>			_____
2. Premedicinering för Trabektedin <i>(Ge Betametason 16 mg peroralt eller som iv injektion 30 minuter före Doxorubicin)</i>			_____
3. Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____			_____
4. Doxorubicin Liposomalt _____ mg i 250 ml Glukos 50 mg/ml Ges intravenöst under 1 tim.		1 tim.	_____	_____
5. Trabektedin _____ mg i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 3 tim.		3 tim.	_____	_____