

Datum: _____
 Läkare: _____
 Kur nr: _____
 Längd (cm): _____ Vikt (kg): _____
 Yta (m²): _____ Aktuellt GFR: _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Äggstockscancer

RegimID: NRB-2887

Cisplatin (intraperitonealt)

Diagnoskod: C56

Ordination/Administrering

Dag	1
Cisplatin Intraperitoneal instillation 100 mg (standarddos)	×1

Lågemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Cisplatin späds lämpligen i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

Anvisningar för ordination

Ge pre- och posthydrering med 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Intravenös posthydrering kan bytas mot dryck.

Vid smärta ge NSAID, t.ex Ibuprofen

Antiemetika

Förslag enligt stöddokument:

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/stoddokument/antiemetika-vuxen/#chapter=Antiemetikaregim-1-dag->

DAG 1 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|
| 1. 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml
<i>Intravenös infusion - prehydrering</i> | 2 tim. | _____ | _____ | |
| 2. Tablett/Injektion Antiemetika

_____ | | | _____ | |
| 3. Cisplatin _____ mg
Ges intraperitonealt | | | _____ | _____ |
| 4. 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml
<i>Intravenös infusion - posthydrering</i> | 1 tim. | _____ | _____ | |