

Antitumoral regim - Äggstockscancer

IP Cisplatin (intraperitonealt)

Indikation: Epitelial cancer C56

Behandlingsavsikt:

RegimID: NRB-2887

Översikt

Läkemedel

Substans	Admin-istrering	Spädning	Infusion-stid	Grunddos/admtillfälle	Beräkn-ingssätt	Maxdos/admtillfälle	Max ack.dos
1. Cisplatin	Intraperitoneal instillation			100 mg	standarddos		

Regimbeskrivning

Dag	1
1. Cisplatin Intraperitoneal instillation 100 mg	x1

Emetogenicitet: Låg**Behandlingsöversikt**

Ges vid ascites. Minst 3 veckor innan behandlingen kan upprepas.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontrollera kreatinin, Om S-kreatinin över normalvärde görs kontroll av njurfunktion med clearancebestämning enligt lokal metod (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearance eller motsvarande). Riktvärde GFR > 60.

Villkor och kontroller för administration

Cisplatin späds lämpligen i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

Anvisningar för ordination

Ge pre- och posthydrering med 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Intravenös posthydrering kan bytas mot dryck.

Vid smärta ge NSAID, t.ex Ibuprofen

Övrig information

Kan ge övergående buksmärtor.

Biverkningar

Cisplatin**Observandum****Kontroll****Stödjande behandling****CAVE aminoglykosider**

Aminoglykosider skall inte ges under och en månad efter cisplatinbehandling. Kan potentiera kumulativ nefrotoxicitet.

Övrigt

Allergisk reaktion ovanlig vid engångsbehandling intraperitonealt. Kan uppstå vid upprepade behandlingar.

Hematologisk toxicitet

Blodvärden

Enligt lokala riktlinjer

Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Neuropati

Neuropati förekommer.

Gastrointestinal påverkan

Buksmärtor som lokal reaktion. Illamående, kräkningar förekommer. Peritonit omnämns.

Njurtoxicitet

Njurfunktion

Hydrering

Njurtoxicitet även vid intraperitoneal instillation. Hydreringsbehov föreligger.

Fortsättning på nästa sida

Cisplatin (Fortsättning)**Observandum****Kontroll****Stödjande behandling****Interaktionsbenägen substans**

Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t.ex. cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmedel) förstärker cisplatinets nefrotoxiska effekt.