Antitumoral regim - Äggstockscancer RegimID: NRB-2887

Cisplatin (intraperitonealt)

Diagnoskod: C56

Översikt

Läkemedel

Substans	Administrering	Spädning	Infusionstid	Grunddos/ admtillfälle	Beräkningssätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Cisplatin	Intraperitoneal instillation			100 mg	standarddos		

Regimbeskrivning

Dag	1
1. Cisplatin Intraperitoneal instillation 100 mg	x1

Emetogenicitet: Låg

Behandlingsöversikt
Ges vid ascites. Minst 3 veckor innan behandlingen kan upprepas.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen
Kontrollera kreatinin, Om S-kreatinin över normalvärde görs kontroll av njurfunktion med clearencebestämning enligt lokal metod (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearence eller motsvarande). Riktvärde GFR $>$ 60.

Villkor och kontroller för administration
Cisplatin späds lämpligen i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

Anvisningar för ordination
Ge pre- och posthydrering med 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Intravenös posthydrering kan bytas mot dryck.
Vid smärta ge NSAID, t.ex Ibuprofen

Antiemetika
Förslag enligt stöddokument:
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/stoddokument/antiemetika-vuxen/#chapter–Antiemetikaregim-1-dag-

Övrig information
Kan ge övergående buksmärtor.

Biverkningar

Cisplatin

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
CAVE aminoglykosider		
Aminoglykosider skall inte ges under och en månad efter cisplatinbehandling. Kan potentiera kumulativ nefrotoxicitet.		
Övrigt		
Allergisk reaktion ovanlig vid engångsbehandling intraperitonealt. Kan uppstå vid upprepade behandlingar.		
Hematologisk toxicitet	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.		

Fortsättning på nästa sida

Cisplatin (Fortsättning)

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Neuropati		
Neuropati förekommer.		
Gastrointestinal påverkan		
Buksmärta som lokal reaktion. Illamående, kräkningar förekommer. Peritonit omnämns.		
Njurtoxicitet	Njurfunktion	Hydrering
Njurtoxicitet även vid intraperitoneal instillation. Hydreringsbehov föreligger.		
Interaktionsbenägen substans		
Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t.ex. cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmedel) förstärker cisplatinets nefrotoxiska effekt.		

Versionsförändringar

Version 1.1
Lagt till kompletterande titel. (arkiverad)

Version 1.1
Flyttas till öppet arkiv efter genomgång av granskare. (arkiverad)

Version 1.1
antiemetika