

Antitumoral regim - Äggstockscancer

RegimID: NRB-2887

Cisplatin (intraperitonealt)

Diagnoskod: C56

Översikt

Läkemedel

Substans	Admini- strering	Spädning	Infusions- tid	Grunddos/ admtillfälle	Beräk- ningsätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Cisplatin	Intraperitoneal instillation			100 mg	standarddos		

Regimbeskrivning

Dag	1
1. Cisplatin Intraperitoneal instillation 100 mg	x1

Emetogenicitet: Låg

Behandlingsöversikt

Ges vid ascites. Minst 3 veckor innan behandlingen kan upprepas.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontrollera kreatinin, Om S-kreatinin över normalvärde görs kontroll av njurfunktion med clearancebestämning enligt lokal metod (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearance eller motsvarande). Riktvärde GFR > 60.

Villkor och kontroller för administration

Cisplatin späds lämpligen i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

Anvisningar för ordination

Ge pre- och posthydrering med 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Intravenös posthydrering kan bytas mot dryck.

Vid smärta ge NSAID, t.ex Ibuprofen

Antiemetika

Förslag enligt stöddokument:

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/stoddokument/antiemetika-vuxen/#chapter=Antiemetikaregim-1-dag->

Övrig information

Kan ge övergående buksmärtor.

Biverkningar

Cisplatin

Observandum

Kontroll

Stödjande behandling

CAVE aminoglykosider

Aminoglykosider skall inte ges under och en månad efter cisplatinbehandling. Kan potentiella kumulativ nefrototoxicitet.

Övrigt

Allergisk reaktion ovanlig vid engångsbehandling intraperitonealt. Kan uppstå vid upprepade behandlingar.

Hematologisk toxicitet

Blodvärden

Enligt lokala riktlinjer

Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Fortsättning på nästa sida

Cisplatin (Fortsättning)**Observandum****Kontroll****Stödjande behandling****Neuropati**

Neuropati förekommer.

Gastrointestinal påverkan

Buksmärtor som lokal reaktion. Illamående, kräkningar förekommer. Peritonit omnämns.

Njurtoxicitet

Njurfunktion

Hydrering

Njurtoxicitet även vid intraperitoneal instillation. Hydreringsbehov föreligger.

Interaktionsbenägen substans

Samtidig administrering av nefrotoxiska läkemedel (t.ex. cefalosporiner, aminoglykosider, amfotericin B eller kontrastmedel) förstärker cisplatinets nefrotoxiska effekt.

Versionsförändringar**Version 1.1**

Lagt till kompletterande titel. (arkiverad)

Version 1.1

Flyttas till öppet arkiv efter genomgång av granskare. (arkiverad)

Version 1.1

antiemetika