

Antitumoral regim - Äggstockscancer

IP Mitoxantron (intraperitonealt)

Indikation: Epitelial cancer C56

Behandlingsavsikt:
RegimID: NRB-2888

Översikt

Läkemedel

Substans	Admin-istrering	Spädning	Infusion-stid	Grunddos/admtillfälle	Beräkn-ingssätt	Maxdos/admtillfälle	Max ack.dos
1. Mitoxantron	Intraperitoneal instillation			30 mg/m ²	kroppsyta		

Regimbeskrivning

Dag	1
1. Mitoxantron Intraperitoneal instillation 30 mg/m ²	x1

Emetogenicitet: Låg

Behandlingsöversikt

Ges vid ascites. Minst 3 veckor innan behandlingen kan upprepas.

Anvisningar för regimen

Villkor och kontroller för administration

Mitoxantron späds lämpligen i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

Anvisningar för ordination

Vid smärta ge NSAID, t.ex Ibuprofen.

Övrig information

Kan ge övergående buksmärtor.

Om laparocentes behov inom en vecka efter behandling bör ascites betraktas som cytostatikaavfall.

Biverkningar

Mitoxantron Observandum

Kontroll

Stödjande behandling

Gastrointestinal påverkan

Buksmärtor som lokal reaktion förekommer. Bukinfektion/peritonit fåtal fall.

Starkt vävnadsretande