Antitumoral regim - Äggstockscancer RegimID: NRB-2888

Mitoxantron (intraperitonealt)

Diagnoskod: C56

Översikt

Läkemedel

Substans	Administrering	Spädning	Infusionstid	Grunddos/ admtillfälle	Beräkningssätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Mitoxantron	Intraperitoneal instillation			30 mg/m^2	kroppsyta		

Regimbeskrivning

Dag	1
1. Mitoxantron Intraperitoneal instillation 30 mg/m^2	x1

Emetogenicitet: Låg

Behandlingsöversikt
Ges vid ascites. Minst 3 veckor innan behandlingen kan upprepas.

Anvisningar för regimen

Villkor och kontroller för administration
Mitoxantron späds lämpligen i 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

Anvisningar för ordination
Vid smärta ge NSAID, t.ex Ibuprofen.

Antiemetika
Förslag enligt stöddokument:
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/stoddokument/antiemetika-vuxen/#chapter–Antiemetikaregim-1-dag-

Övrig information
Kan ge övergående buksmärtor.

Om laparocentes behov inom en vecka efter behandling bör ascites betraktas som cytostatikaavfall.

Biverkningar

Mitoxantron

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan Buksmärta som lokal reaktion förekommer. Bukinfektion/peritonit fåtal fall.		
Starkt vävnadsretande		

Versionsförändringar

Version 1.1
Flyttas till öppet arkiv efter genomgång av granskare. (arkiverad)

Version 1.1
antiemetika