

Antitumoral regim - Äggstockscancer

RegimID: NRB-2649

Topotekan iv

Diagnoskod: C56

Kurintervall: 21 dagar

Översikt

Läkemedel

Substans	Admini- strering	Spädning	Infusions- tid	Grunddos/ admtillfälle	Beräk- ningssätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Topotekan	Intravenös infusion	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion	30 min.	1,5 mg/m ²	kroppsyta		

Regimbeskrivning

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
1. Topotekan Intravenös infusion 1,5 mg/m ²	x1	x1	x1	x1	x1																	

Emetogenicitet: Låg

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blod-, lever och elektrolytstatus med clearance (Cystatin C, lohexol, kreatininclearance eller motsvarande).

GFR ska vara ≥ 60 ml/min.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blodstaus inkl neutrofila och kreatinin. För behandlingsstart neutrofila $>1,5$, TPK >100 och Hb > 90 .

Dosjustering rekommendation

Hematologisk toxicitet

NADIR-värde för neutrofila $< 1,0$ - ge nästa kur med 80 % av dosen.Om NADIR-värden efter dosreduktion fortsatt är neutrofila $< 1,0$ - dosreducera ytterligare 10-15 % eller byt regim.Vid diarré av grad 3 eller 4 ska doserna minskas med 0,4 mg/m²/dygn.

Antiemetika

Förslag enligt stöddokument:

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/lakemedelsregimer/antiemetika/forebyggande-mot-illamaende-steg-2a-5d/>

Biverkningar

Topotekan

Observandum

Kontroll

Stödjande behandling

Hematologisk toxicitet

Blodvärden

Enligt lokala riktlinjer

Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Gastrointestinal påverkan

Biverkningskontroll

Loperamid

Illamående, kräkningar och diarré mkt vanligt, kan bli allvarliga. Symtomatisk behandling av diarré viktigt. Dessutom kan topotekaninducerad neutropeni orsaka neutropen kolit, se FASS.

Andningsvägar

Monitorering

Kan ge interstitiell lungsjukdom (ILD). Underliggande riskfaktorer är tidigare ILD, lungfibros, lungcancer, exponering av torax för strålning, lungtoxiska läkemedel och/eller kolonistimulerande faktorer (tillväxtfaktorer).

Fortsättning på nästa sida

Topotekan (Fortsättning)**Observandum****Kontroll****Stödjande behandling****Extravasering**

Kyla

Gul

Vävnadsretande, men ger sällan allvarlig skada (medelhög risk för vävnadsskada).

Följ instruktionen för kylbehandling, se stöddokument Extravasering.

Versionsförändringar**Version 1.7**

ny antiemetikalänk

Version 1.6

Tagit bort information om premedicinering -antiemetika då den är tillagd i antiemetikaruta istället.

Version 1.5

antiemetika

Version 1.4

Justerat information om premedicinering efter byte till lågemetogen regim.

Version 1.3

Ändrat till lågemetogen.

Version 1.2

Tagit bort avsnitt om graviditet under "Allmänna råd"

Version 1.1

lagt till patientinfo