

Datum: _____
Läkare: _____
Kur nr: _____
Längd (cm): _____ **Vikt (kg):** _____
Yta (m²): _____ **Aktuellt GFR:** _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Akut myeloisk leukemi (AML)

RegimID: NRB-8957

FAV-Ida induktion

Diagnoskod: C92

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7
Fludarabin Intravenös infusion 30 mg/m ² (kroppsyta)	x1	x1	x1	x1	x1		
Cytarabin Intravenös infusion 1500 mg/m ² (kroppsyta)	x1	x1	x1	x1	x1		
Idarubicin Intravenös infusion 10 mg/m ² (kroppsyta)			x1	x1	x1		
Venetoklax Peroral tablett 400 mg (standarddos)	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1

Medelemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration

Idarubicin Starkt vävnadsretande. Central infart rekommenderas.*Cytarabin* startas 4 timmar efter start av Fludarabin.*Venetoklax*: Grapefrukt, pomerans och stjärnfrukt (carambola) och johannesört ska ej intas under behandlingen.

Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 8 timmar kvar till nästa planerade dos.

Om en patient kräks efter dosering ska ingen ytterligare dos tas samma dag. Nästa ordinerade dos ska tas på schemalagd tid nästa dag.

Venetoklax Peroral tablett

Dosering i förhållande till måltid: Tas i samband med måltid

Anvisningar för ordination

Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus inkl kreatinin.

Observans på tumörlyssyndrom.

G-CSF alternativt Pegfilgrastim bör övervägas från dag 7.

Idarubicin: Dosen anpassas (6-10 mg/m²) efter kumulativ dos av antracykliner, komorbiditet, om det är induktion eller konsolidering etc*Venetoklax*: Observera interaktion med antimykotika tex Posakonazol. Om nödvändig Pozakonazolbehandling, reducera dosen Venetoklax till 100 mg eller lägre.

Poängtera vikten av att ta Venetoklax tillsammans med mat.

Antiemetika

Förslag enligt stöddokument:

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/lakemedelsregimer/antiemetika/forebyggande-mot-illamaende-steg-5a-5d/>
alternativt<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/lakemedelsregimer/antiemetika/forebyggande-mot-illamaende-steg-5b-5d/>**DAG 1** Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign****1. Venetoklax _____ mg**

Ges peroralt

*(Tillsammans med mat.)***2. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml***Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet***3. Tablett/Injektion Antiemetika**

4. Fludarabin _____ mg

i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 30 min.

30 min.

5. Cytarabin _____ mg

i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 2 tim.

(OBS! Infusionen med Cytarabin startas 4 timmar efter start av Fludarabin)

2 tim.

DAG 2 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign****1. Venetoklax _____ mg**

Ges peroralt

*(Tillsammans med mat.)***2. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml***Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet***3. Tablett/Injektion Antiemetika**

4. Fludarabin _____ mg

i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 30 min.

30 min.

5. Cytarabin _____ mg

i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 2 tim.

(OBS! Infusionen med Cytarabin startas 4 timmar efter start av Fludarabin)

2 tim.

DAG 3 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Venetoklax _____ mg Ges peroralt (Tillsammans med mat.)			_____	_____
2. 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet			_____
3. Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____			_____
4. Fludarabin _____ mg i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min.	30 min.		_____	_____
5. Cytarabin _____ mg i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. (OBS! Infusionen med Cytarabin startas 4 timmar efter start av Fludarabin)	2 tim.		_____	_____
6. Idarubicin _____ mg i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 8 tim.	8 tim.		_____	_____

DAG 4 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Venetoklax _____ mg Ges peroralt (Tillsammans med mat.)			_____	_____
2. 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet			_____
3. Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____			_____
4. Fludarabin _____ mg i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 30 min.	30 min.		_____	_____
5. Cytarabin _____ mg i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 2 tim. (OBS! Infusionen med Cytarabin startas 4 timmar efter start av Fludarabin)	2 tim.		_____	_____
6. Idarubicin _____ mg i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 8 tim.	8 tim.		_____	_____

DAG 5 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Venetoklax _____ mg

Ges peroralt

(Tillsammans med mat.)

2. 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet

.....

3. Tablett/Injektion Antiemetika

.....

4. Fludarabin _____ mg

i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 30 min.

30 min.

5. Cytarabin _____ mg

i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 2 tim.

(OBS! Infusionen med Cytarabin startas 4 timmar efter start av Fludarabin)

2 tim.

6. Idarubicin _____ mg

i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Ges intravenöst under 8 tim.

8 tim.

DAG 6 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Venetoklax _____ mg

Ges peroralt

(Tillsammans med mat.)

DAG 7 Datum _____ Beställs till kl _____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Venetoklax _____ mg

Ges peroralt

(Tillsammans med mat.)
