

## Förebyggande mot illamående (Steg 2a, 5d)

Antiemetika

---

### Schema för regimen

Dag	1	2	3	4	5
Ondansetron Morgondos	X	X	X	X	X
Olanzapin Vid behov					

### Om din behandling

Du ska ta förebyggande behandling för att minska risk för illamående i samband med din behandling. En del läkemedel minskar även risken för allergi som vissa behandlingar kan ge. Om du missat att ta din dos tala om det för din sjuksköterska. Det är viktigt att du noterar hur du mår för att vi ska kunna justera dosen av läkemedel.

### Så ska du ta din behandling

#### Dag 1

##### Cirka 1-2 timmar före behandling

Ondansetron 8 mg: 1 tablett

#### Dag 2

##### Cirka 1-2 timmar före behandling

Ondansetron 8mg: 1 tablett

#### Dag 3

##### Cirka 1-2 timmar före behandling

Ondansetron 8 mg: 1 tablett

#### Dag 4

##### Cirka 1-2 timmar före behandling

Ondansetron 8 mg: 1 tablett

#### Dag 5

##### Cirka 1-2 timmar före behandling

Ondansetron 8 mg: 1 tablett

#### Vid behov, behandlingsdagar och ett par dagar efter

Olanzapin 2,5 mg. Vid behov kan man öka till högst fyra tabletter (10 mg) per dygn. Tas med fördel till natten eftersom läkemedlet ger trötthet.

### Förebyggande läkemedel mot illamående

Du kan få läkemedlen av din sjuksköterska eller på recept.

## **Ondansetron**

Ondansetron är tabletter som sväljes hela med eller utan mat. Dosen tas minst en timma före behandling. Det är vanligt att få förstoppning av ondansetron. Detta kan förebyggas med laxermedel. Informera vårdpersonalen före behandling om du har trög mage. Det är också vanligt med huvudvärk. Detta kan behandlas med paracetamol.

## **Olanzapin**

Olanzapin är ett läkemedel som används vid psykisk ohälsa men i låga doser har god effekt mot illamående, särskilt mot illamående som kan uppkomma dagar efter behandling.

Du kan bli trött av Olanzapin. Tröttheten kan minska uppmärksamhet vid tex bilkörning vilket kan göra det olämpligt att framföra motorfordon. Vi rekommenderar att ta dosen på kvällen, med första dos behandlingsdagens kväll.

Man ska ta högst 10 mg Olanzapin under en dag. Högre dos ger inte bättre effekt.

# Illamåendedagbok

Registrera ditt mående och återkoppla till din sjuksköterska.

<b>Namn:</b>		<b>Personnummer:</b>										
<b>Behandling:</b>												
<b>Kurnummer:</b>								<b>Startdatum:</b>				
Datum dag 1:		Illamående			Kräkning		Matleda		Upplevt välbefinnande			Anteckningar
		Inget	Lätt	Starkt	Ja	Nej	Ja	Nej	Bra	Dåligt	Mycket dåligt	
<b>Dag 1</b>	Kväll											
<b>Dag 2</b>	Morgon											
	Dag											
	Kväll											
<b>Dag 3</b>	Morgon											
	Dag											
	Kväll											
<b>Dag 4</b>	Morgon											
	Dag											
	Kväll											
<b>Dag 5</b>	Morgon											
	Dag											
	Kväll											