

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

## Antiemetikaregim

Behandlingsavsikt: Medelemetogen

RegimID: NRB-11134

**Förebyggande mot illamående 2d (Steg 3, 2d)**  
(Medelemetogen)

## Ordination/Administrering

| Dag                                                               | 1  | 2  |
|-------------------------------------------------------------------|----|----|
| Betametason<br>Peroral tablett<br>4 mg (standarddos)              | x1 | x1 |
| Ondansetron<br>Peroral tablett<br>8 mg (standarddos)              | x1 | x1 |
| Olanzapin<br>Peroral tablett<br>2,5 mg (standarddos)<br>Vid behov |    |    |

**Villkor och kontroller för administration**

Betametason tabletter löses upp i lite vatten före intag.

Olanzapin tas med fördel till natten. Sederande.

**Anvisningar för ordination**

Ondansetron: Kan ges i samma dos intravenöst. Ökad risk för förstoppning under kontinuerlig användning. Patienten bör ha tillgång till laxerande medel att ta vid behov.

Betametason: Tabletter löses upp i lite vatten före intag. Kan ges i samma dos intravenöst. Kan medföra högre B-glukos hos diabetiker.

Olanzapin: Sederande neuroleptikum, tas med fördel till natten. Dosering: 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten vid behov behandlingsdygn och ett par dagar efter

**Dosjustering rekommendation**

Om otillräcklig effekt höj dosen Olanzapin eller om patienten mått dåligt efter föregående regim, öka antiemetikasteget med 1-2 steg.

Använd illamåendedagbok för utvärdering.

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Ondansetron** \_\_\_\_\_ **mg** Morgondos

Ges peroralt

(*Tas minst en timma före antitumoral behandling.*)

2. **Betametason** \_\_\_\_\_ **mg** Morgondos

Ges peroralt

(*Tas minst en timma före antitumoral behandling.*

*Hela dosen löses upp i lite vatten före intag.*)

3. Samt vid behov Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

.....

**DAG 2** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Ondansetron** \_\_\_\_\_ **mg** Morgondos

Ges peroralt

(*Tas minst en timma före antitumoral behandling.*)

2. **Betametason** \_\_\_\_\_ **mg** Morgondos

Ges peroralt

(*Tas minst en timma före antitumoral behandling.*

*Hela dosen löses upp i lite vatten före intag.*)

3. Samt vid behov Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

.....