

Datum: _____
 Läkare: _____
 Kur nr: _____
 Längd (cm): _____
 Yta (m²): _____

Vikt (kg): _____
 Aktuellt GFR: _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antiemetikaregim

Behandlingsavsikt: Högemetogen, Medeemetogen
 RegimID: NRB-11109

Förebyggande mot illamående (Steg 5a, 4d) (Medeemetogen, Högemetogen)

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6
Palonosetron Peroral kapsel 500 mg	x1			x1		
Betametason Peroral tablett 6 mg	x1	x1	x1	x1		
Betametason Peroral tablett 4 mg					x1	
Betametason Peroral tablett 2 mg						x1
Olanzapin Peroral tablett 2,5 mg						
Vid behov						

Villkor och kontroller för administration

Palonosetron: Kapseln tas minst 1 timme före start av antitumoral behandling.

Betametason tablett löses upp i lite vatten före intag.

Olanzapin tas med fördel till natten. Sederande.

Anvisningar för ordination

Palonosetron: Kan ges både oralt och intravenöst. Kapsel Palonosetron 500 mikrogram ges 1 timme före behandling dag 1. Infektion 250 mikrogram (5 ml) Palonosetron ges som enskilda intravenösa bolusdos ungefär 30 minuter innan cytostatikabehandlingen (endast dag 1). Infektionen ska ta 30 sekunder. Ökad risk för förstopning. Patienten bör ha tillgång till laxerande medel att ta vid behov.

Observera: Vid cytostatikabehandling som ges > 3 dagar eller samtidig strålbehandling kan ny dos Palonosetron upprepas. Annan 5-HT3-receptorantagonist kan ges tidigast 48 timmar efter senaste dos Palonosetron.

Betametason: Tablett löses upp i lite vatten före intag. Kan ges i samma dos intravenöst. Kan medföra högre B-glukos hos diabetiker.

Olanzapin: Sederande neuroleptikum, tas med fördel till natten. Dosering: 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten vid behov behandlingsdagen och ett par dagar efter.

Om möjligt avsluta Betametason tidigare dvs korta svansen.

Dosjustering rekommendation

Om otillräcklig effekt höj dosen Olanzapin eller om patienten mått dåligt efter föregående regim, öka antiemetikasteget med 1-2 steg.

DAG 1 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 1. Palonosetron _____ mg | Morgondos | _____ | _____ |
| Ges peroralt
<i>(Tas minst en timma före antitumoral behandling.)</i> | | | |
| 2. Betametason _____ mg | Morgondos | _____ | _____ |
| Ges peroralt
<i>(Tas minst en timma före antitumoral behandling.
Hela dosen löses upp i lite vatten före intag.)</i> | | | |
| 3. Samt vid behov Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten | | | |

DAG 2 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 1. Betametason _____ mg | Morgondos | _____ | _____ |
| Ges peroralt
<i>(Tas minst en timma före antitumoral behandling.
Hela dosen löses upp i lite vatten före intag.)</i> | | | |
| 2. Samt vid behov Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten | | | |

DAG 3 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 1. Betametason _____ mg | Morgondos | _____ | _____ |
| Ges peroralt
<i>(Hela dosen löses upp i lite vatten före intag.)</i> | | | |
| 2. Samt vid behov Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten | | | |

DAG 4 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 1. Palonosetron _____ mg | Morgondos | _____ | _____ |
| Ges peroralt
<i>(Tas minst en timma före antitumoral behandling.)</i> | | | |
| 2. Betametason _____ mg | Morgondos | _____ | _____ |
| Ges peroralt
<i>(Tas minst en timma före antitumoral behandling.
Hela dosen löses upp i lite vatten före intag.)</i> | | | |
| 3. Samt vid behov Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten | | | |

DAG 5 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| 1. Betametason _____ mg | Morgondos | _____ | _____ |
| Ges peroralt
<i>(Hela dosen löses upp i lite vatten före intag.)</i> | | | |
| 2. Samt vid behov Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten | | | |

DAG 6 Datum_____ Beställs till kl_____ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. **Betametason** _____ **mg** Morgondos _____
Ges peroralt
(Hela dosen löses upp i lite vatten före intag.)

2. Samt vid behov Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten