

# Antiemetikaregim Förebyggande mot illamående (Steg 6, 3d) (Högemetogen)

Behandlingsavsikt: Högemetogen  
RegimID: NRB-11149

## Översikt

### Läkemedel

Substans	Admin- istrering	Spädning	Infusion- stid	Grunddos/ admtillfälle	Beräk- ningssätt	Maxdos/ admtillfälle	Max ack. dos
1. Netupitant, palonosetron (300/0,5)	Peroral kapsel			300 mg	standarddos		
2. Betametason	Peroral tablett			8 mg	standarddos		
3. Olanzapin	Peroral tablett			5 mg	standarddos		

### Regimbeskrivning

Dag	1	2	3	4	5	6
1. Netupitant, palonosetron (300/0,5) Peroral kapsel 300 mg	x1					
2. Betametason Peroral tablett 8 mg	x1	x1	x1			
3. Olanzapin Peroral tablett 5 mg	x1	x1	x1	x1	x1	x1

#### Behandlingsöversikt

Antiemetikaregim utan kortisonsvans vid högmetogen antitumoral behandling under 3 dagar.

### Anvisningar för regimen

#### Villkor och kontroller för administration

Netupitant/Palonosetron: Kapseln tas minst 1 timme före start av antitumoral behandling.

Betametason tabletter löses upp i lite vatten före intag.

Olanzapin tas med fördel till natten. Sederande.

Netupitant, palonosetron (300/0,5)

Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

#### Anvisningar för ordination

Netupitant/palonosetron ersätts med: Fosaprepitant 150 mg +Palonosetron 250 µg om det skall ges intravenöst Se FASS.

Netupitant/Palonosetron är ett dubbelverkande antiemetikum som blockerar NK1-receptorer och är samtidigt en långtidsverkande 5-HT3-receptorblockerare. Under behandling och dagarna efter Netupitant/Palonosetron skall man inte ge 5-HT3-receptorblockerare eller NK-1 receptorantagonist. Netupitant/Palonosetron bör kombineras med ett kortisonpreparat. Obs! Dosen betametason > 12mg skall ej överskridas, eftersom nedbrytningen av kortison hämmas av Netupitant/Palonosetron. Ökad risk för förstoppning. Patienten bör ha tillgång till laxerande medel att ta vid behov.

Betapred ges i samma dos om det ges intravenöst.

Olanzapin: Dosering: 5 mg (högst 10 mg) till natten vid behov behandlingsdygn och ett par dagar efter.

**Dosjustering rekommendation**

Om patienten blir mycket påverkad av 5 mg Olanzapin, sänk till 2,5 mg.

Om otillräcklig effekt höj dosen Olanzapin eller om patienten mått dåligt efter föregående regim, öka antiemetikasteget med 1 steg.

Använd illamåendedagbok för utvärdering.

**Biverkningar****Netupitant, palonosetron (300/0,5)**

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Gastrointestinal påverkan</b> Förstoppning förekommer.		
<b>Övrigt</b> Huvudvärk och trötthet förekommer. Sömnstörning har rapporterats.		Paracetamol
<b>Hjärttoxicitet</b> Inga QT-intervallförlängningar har rapporterats, men pga att andra 5 HT3 receptor antagonister haft rapporter om detta, så rekommenderas försiktighet vid användning hos patienter med tidigare arythmi eller retledningsstörning i hjärtat, behandling med antiarytmika eller beta-blockare, eller vid hjärttoxiska kemoterapier och/eller elektrolytrubbning.		
<b>Graviditetsvarning</b> Inga data på människor. Djurstudier har visat fosterskadande effekter. Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under och upp till en månad efter avslutad behandling.		
<b>Interaktionsbenägen substans</b> Netupitant är en måttlig CYP3A4-hämmare. (Exempel på substanser som berörs är; Dexametason, Docetaxel och Etoposid.) Samtidig administrering av kortikosteroider och Aprepitant kan medföra behov av sänkt dos kortikosteroid, se FASS. (Antiemetikagrupp föreslår att dos Betametason ej skall vara >12 mg, då nedbrytningen av kortikosteroid hämmas av Netupitant.) Samtidig administrering av Docetaxel och Etoposid med Netupitant/Palonosetron kan kräva försiktighet, då koncentrationen av Docetaxel och Etoposid kan öka.  Samtidig administrering med starka CYP3A4-hämmare ska ske med försiktighet, då risk finns för ökad koncentration av Netupitant. (Exempel på stark CYP3A4-hämmare är ketokonazol.) Samtidig administrering av starka CYP3A4-inducerare ska undvikas, då risk finns för minskad koncentration av Netupitant. (Exempel på stark CYP3A4-inducerare är rifampicin.) Samtidig användning av andra serotonerga läkemedel ökar risk för serotonergt syndrom, se FASS.		

**Olanzapin**

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
<b>Hematologisk toxicitet</b> Neutropeni förekommer vid regelbunden behandling, osäkert vid kortvarig administrering.		
<b>Övrigt</b> Trötthet vanligt, enligt kliniska uppgifter även vid kortvarig administrering. Bör beaktas vid exempelvis bilkörning och maskinanvändande. Dosering till kväll eller natt kan vara en fördel.		
<b>CNS påverkan</b> Kramper har rapporterats, oftast då riskfaktorer för kramper föreläggat eller känd benägenhet för kramper. Detta gäller regelbunden behandling, osäkert vid kortvarig administrering.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b> Vissa antikolinerga effekter, milda övergående effekter som förstoppning har angivits som vanliga vid regelbunden medicinerings, osäkert vid kortvarig administrering.		
<b>Hypotension</b> Ortostatisk hypotension har angivits som vanlig vid regelbunden behandling, osäkert vid kortvarig administrering.		

Fortsättning på nästa sida

## Olanzapin (Fortsättning)

### Observandum

### Kontroll

### Stödjande behandling

#### Graviditetsvarning

Om möjligt bör användning under graviditet undvikas. Större studier saknas, det kan finnas risk för fosterpåverkan och svagt samband med gomsplatt har antytts, vid daglig användning vid antipsykotisk indikation. Vid användning tredje trimestern finns eventuellt risk för extrapyramidala symtom eller abstinens hos nyfödd. Var god se Janusmed för aktuell information.

Vid amning passerar olanzapin över i bröstmjolk, dock i låg koncentration. Amning rekommenderas ej, men var god se Janusmed för aktuell information.

#### Interaktionsbenägen substans

Rökning kan minska effekten av Olanzapin.

Eventuellt bör Olanzapin ej kombineras med metoklopramid på grund av ökad risk för extrapyramidala biverkningar, men omnärms ej så specifikt i FASS.

Olanzapin metaboliseras via CYP1A.

CYP1A induceras av bland annat rökning och karbamazepin, samtidig administrering kan ge lägre effekt av Olanzapin.

CYP1A hämmas av exempelvis fluvoxamin och ciprofloxacin, samtidig administrering kan ge högre effekt av Olanzapin.

Olanzapin kan motverka de direkta eller indirekta effekterna av dopaminagonister.

## Versionsförändringar

### Version 1.0

Regimen fastställdes.