

Datum: \_\_\_\_\_  
Läkare: \_\_\_\_\_  
Kur nr: \_\_\_\_\_  
Längd (cm): \_\_\_\_\_ Vikt (kg): \_\_\_\_\_  
Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Antiemetikaregim

Behandlingsavsikt: Högemetogen, Medelemetogen

RegimID: NRB-9634

## Förebyggande mot illamående (Steg 5b, 1d) (Medelemetogen, Högemetogen)

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3
Aprepitant Peroral kapsel 125 mg (standarddos)	x1		
Aprepitant Peroral kapsel 80 mg (standarddos)		x1	x1
Ondansetron Peroral tablett 8 mg (standarddos)	x2		
Betametason Peroral tablett 6 mg (standarddos)	x1		
Betametason Peroral tablett 4 mg (standarddos)		x1	
Betametason Peroral tablett 2 mg (standarddos)			x1
Olanzapin Peroral tablett 2,5 mg (standarddos) <b>Vid behov</b>			

### Villkor och kontroller för administration

Aprepitant: Kapseln tas minst 1 timme före start av antitumoral behandling.

Betametason tabletter löses upp i lite vatten före intag.

Olanzapin tas med fördel till natten. Sederande.

### Anvisningar för ordination

Aprepitant 125 mg ersätts med Fosaprepitant 150 mg om det ges intravenöst.

Ondansetron: Kan ges i samma dos intravenöst. Ökad risk för förstoppning under kontinuerlig användning. Patienten bör ha tillgång till laxerande medel att ta vid behov.

Betametason: Kan ges i samma dos intravenöst. Kan medföra högre B-glukos hos diabetiker. Betametason dag 2 och 3 kan uteslutas vid behandlingar som inte ger fördröjt illamående (ta bort kortisonsvans).

Olanzapin: Sederande neuroleptikum, tas med fördel till natten. Dosering: 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten vid behov behandlingsdygn och ett par dagar efter.

Om möjligt avsluta Betametason tidigare dvs korta svansen.

**Dosjustering rekommendation**

Om otillräcklig effekt höj dosen Olanzapin eller om patienten mått dåligt efter föregående regim, öka antiemetikasteget med 1-2 steg.

Använd illamåendedagbok för utvärdering.

**DAG 1** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

<b>1. Aprepitant _____ mg</b> Ges peroralt ( <i>Tas minst en timma före antitumoral behandling.</i> )	Morgondos	_____	_____
<b>2. Ondansetron _____ mg</b> Ges peroralt ( <i>Tas minst en timma före antitumoral behandling.</i> )	Morgondos	_____	_____
<b>3. Betametason _____ mg</b> Ges peroralt ( <i>Tas minst en timma före antitumoral behandling. Hela dosen löses upp i lite vatten före intag.</i> )	Morgondos	_____	_____
<b>4. Ondansetron _____ mg</b> Ges peroralt	Kvällsdos	_____	_____
<b>5. Vid behov Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten</b>		.....	

**DAG 2** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

<b>1. Aprepitant _____ mg</b> Ges peroralt	Morgondos	_____	_____
<b>2. Betametason _____ mg</b> Ges peroralt ( <i>Hela dosen löses upp i lite vatten före intag.</i> )	Morgondos	_____	_____
<b>3. Vid behov Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten</b>		.....	

**DAG 3** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

<b>1. Aprepitant _____ mg</b> Ges peroralt	Morgondos	_____	_____
<b>2. Betametason _____ mg</b> Ges peroralt ( <i>Hela dosen löses upp i lite vatten före intag.</i> )	Morgondos	_____	_____
<b>3. Vid behov Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten</b>		.....	