

Antitumoral regim - Bröstcancer

Behandlingsavsikt: Palliativ

Eribulin

RegimID: NRB-1169

Kurintervall: 21 dagar

Översikt

Läkemedel

Substans	Admin-istrering	Spädning	Infusion-stid	Grunddos/admtillfälle	Beräkn-ingssätt	Maxdos/admtillfälle	Max ack.dos
1. Eribulin	Intravenös infusion	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion	5 min.	1,23 mg/m ²	kroppsyta		

Regimbeskrivning

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
1. Eribulin Intravenös infusion 1,23 mg/m ²	x1							x1														

Emetogenicitet: Låg

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen
Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus inkl kreatinin.

Anvisningar för ordination
Blodstatus inkl neutrofila. LPK>2,5, neutrofila >1,0, TPK>75 för start. Kontroll av perifer neuropati.

Dosjustering rekommendation
Hematologiska biverkningar, neuropati, leverpåverkan se FASS.
Överväg primär dosreduktion hos patienter som fått flera linjers behandlingar med cytostatika

Antiemetika
Förslag enligt stöddokument:
<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/stoddokument/antiemetika-vuxen/#chapter=Antiemetikaregim-1-dag->

Biverkningar

Eribulin Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.	Blodvärden	Enligt lokala riktlinjer
Neuropati Patienter ska övervakas noggrant med avseende på tecken på perifer motorisk och sensorisk neuropati.	Biverkningskontroll	
Hjärttoxicitet QT-förlängning har rapporterats. Försiktighet vid känd hjärtsvikt, bradyarytmi, samtidig behandling med läkemedel med risk för QT-förlängning eller elektrolytrubbning. Om behandling trots dessa riskfaktorer rekommenderas EKG övervakning, se FASS.	EKG	
Levertoxicitet Förhöjda levervärden vanligt. Förhöjningar inte helt ansedda som äkta toxicitet, se FASS, men vid ALAT eller ASAT värden >3 ggr övre normalgränsen ökar risken för uttalad hematologisk toxicitet.	Leverfunktion	
Gastrointestinal påverkan Illamående, förstoppning, diarré, kräkning och nedsatt aptit vanligt, men sällan grad 3-4. Buksmärt, stomatit, muntorrhet och reflux förekommer.		

Fortsättning på nästa sida

Eribulin (Fortsättning)

Observandum	Kontroll	Stödjande behandling
Hudtoxicitet		
Håravfall (alopeci) vanligt. Utslag, klåda och nagelförändringar förekommer.		
Palmar-plantar erytrodysestesi (PPE) finns rapporterat.		
Andningsvägar		
Andfåddhet/dyspné och hosta vanligt, oftast grad 1-2. Orofaryngeal smärta, näsblod och rinorré förekommer.		
Interstitiell lungsjukdom finns rapporterad.		
Övrigt		
Muskel och ledvärk vanligt. Ryggsmärta förekommer. Skelettsmärta förekommer.		
Huvudvärk, utmattning/fatigue och feber vanligt. Sömnsvårigheter och yrsel förekommer.		
Övrigt		
Hypokalemi, hypomagnesemia och hypokalcemi förekommer. Hyperglykemi förekommer.		
Extravasering (Grön)		
Klassas som ej vävnadsskadande (låg eller minimal risk för vävnadsskada vid extravasering).		

Versionsförändringar

Version 1.1
antiemetika