

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Antitumoral regim - Bröstcancer

RegimID: NRB-10949

**Fulvestrant****Ordination/Administrering**

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Fulvestrant Intramuskulär injektion 500 mg (standarddos)	x1														x1						
Dag	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fulvestrant Intramuskulär injektion 500 mg (standarddos)								x1													
Dag	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Fulvestrant Intramuskulär injektion 500 mg (standarddos)															x1						

Minimalemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Villkor och kontroller för administration**

Fulvestrant ska administreras som två efter varandra följande 5 ml injektioner genom långsam intramuskulär injektion (1-2 minuter/injektion), en i varje skinka (glutealområdet).

Se läkemedlets bruksanvisning för exakt hantering av sprutan.

På grund av närheten till den underliggande ischiasnerven måste försiktighet iakttas om Fulvestrant administreras vid det dorsogluteala injektionsstället.

Allergiska och anafylaktiska reaktioner har observerats, både i form av lokala reaktioner på injektionsstället och systemiska symtom.

**Antiemetika**

Ingen rutinmässig behandling

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Fulvestrant \_\_\_\_\_ mg**

Ges intramuskulärt

(Injektionen ges som två sprutor om 250 mg i vardera skinkan under 1-2 min/inj.)

**DAG 15** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Fulvestrant \_\_\_\_\_ mg**

Ges intramuskulärt

*(Injektionen ges som två sprutor om 250 mg i vardera skinkan under 1-2 min/inj.)*

\_\_\_\_\_

**DAG 29** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Fulvestrant \_\_\_\_\_ mg**

Ges intramuskulärt

*(Injektionen ges som två sprutor om 250 mg i vardera skinkan under 1-2 min/inj.)*

\_\_\_\_\_

**DAG 57** Datum\_\_\_\_\_ Beställs till kl\_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

**1. Fulvestrant \_\_\_\_\_ mg**

Ges intramuskulärt

*(Injektionen ges som två sprutor om 250 mg i vardera skinkan under 1-2 min/inj.)*

\_\_\_\_\_