

**Antitumoral regim - Bröstcancer**  
**Trastuzumab emtansine (Kadcyla)**  
 Kurintervall: 21 dagar

Behandlingsavsikt: Adjuvant, Palliativ

RegimID: NRB-1177

**Översikt****Läkemedel**

Substans	Admin-istrering	Spädning	Infusion-stid	Grunddos/admtillfälle	Beräkn-ingssätt	Maxdos/admtillfälle	Max ack. dos
1. Trastuzumab emtansin	Intravenös infusion	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion	30 min.	3,6 mg/kg	kroppsvikt		

**Regimbeskrivning**

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
1. Trastuzumab emtansin Intravenös infusion 3,6 mg/kg	x1																					

**Emetogenicitet:** Låg**Anvisningar för regimen****Villkor för start av regimen**

HER-2 positiv bröstcancer.

Kontroll av blod-, leverstatus och kreatinin. Kontroll av vänsterkammarfunktion.

**Villkor och kontroller för administration**

Ökad beredskap för anafylaktisk reaktion.

Första behandlingen ges på 90 minuter, om ingen reaktion kan nästkommande ges på 30 minuter.

Infusionsaggregat med ett inre polyetersulfonfilter 0,22 mikrometer ska användas.

**Anvisningar för ordination**

Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila. Kontroll av lever- och elektrolytstatus. LPK&gt;2,5 och TPK&gt;100 för start.

TPK&gt;75 för efterföljande behandlingar.

Regelbunden kontroll av vänsterkammarfunktion (1ggr/år).

**Dosjustering rekommendation**

Dosreduktion sker i två steg. - 3 mg/kg (83%); -2,4 mg/kg (67%). Se schema i

<https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20121010000058#dosage>**Antiemetika**

Förslag enligt stöddokument:

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/stoddokument/antiemetika-vuxen/#chapter-Antiemetikaregim-1-dag->**Biverkningar**

<b>Trastuzumab emtansin Observandum</b>	<b>Kontroll</b>	<b>Stödjande behandling</b>
<b>Akut infusionsreaktion/anafylaxi</b>	Blodtryck Puls	Akutberedskap Antihistamin Paracetamol
Akut infusionsreaktion har rapporterats. Kontroller minst 90 minuter efter första dos (som ges på 90 min), kontroll minst 30 minuter efter kommande doser (som ges på 30 min). Om infusionsreaktion ska infusionen avbrytas eller infusionshastigheten sänkas. Eventuellt symptomatisk behandling.		
Permanent utsättning av behandling efter allvarlig infusionsreaktion.		
<b>Hematologisk toxicitet</b> Blodvärden Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos. Trombocytopeni vanligt, oftast grad 1-2. Blödningsrisk ökad, inte alltid kopplat till trombocytantal. Neutropeni förekommer.		
<b>Hjärttoxicitet</b> Hjärtfunktion Vänsterkammardysfunktion förekommer, oftast mild grad, men grad 3 - 4 har rapporterats. LVEF (vänsterkammarfunktion) bör monitoreras regelbundet. Eventuellt behov av dosjustering, tillfälligt uppehåll eller avbrytande av behandling, se FASS. Notera risk interaktion antracykliner (kardiotoxiskt, även kumulativt).		
<b>Andningsvägar</b> Radiologi Hosta, dyspné (andfåddhet) och näsljud vanligt. Interstitiell pneumonit finns rapporterat. Nyttillsökta eller akut förändrade andningssymtom ska utredas.		
<b>Levertoxicitet</b> Leverfunktion Förhöjda transaminaser mycket vanligt, oftast grad 1- 2, men grad 3 - 4 finns rapporterat. Förhöjt bilirubin vanligt. Kontroll av leverfunktionsvärden före och under behandling. Eventuellt behov av dosjustering, tillfälligt uppehåll eller avbrytande av behandling, se FASS. Förhöjt ALP (alkaliskt fosfatas) förekommer. Leversvikt fallrapporter.		
<b>Gastrointestinal påverkan</b> Illamående, kräkning vanligt. Förstopning, diarré och buksmärta vanligt. Stomatit vanligt.		
<b>Neuropati</b> Biverkningskontroll Perifer neuropati, framför allt sensorisk, vanlig, oftast grad 1, men högre grad har rapporterats. Eventuellt tillfälligt uppehåll av behandling, se FASS.		
<b>Övrigt</b> Trötthet (fatigue) och huvudvärk vanligt. Yrsel förekommer. Hypokalemia vanligt. Muskeloskeletal smärta, ledsmärta och myalgi vanligt.		
<b>Hudtoxicitet</b> Utslag och klåda förekommer.		
<b>Extravasering (Gul)</b> Klassas som vävnadsretande, men ger sällan allvarlig skada (medelhög risk för vävnadsskada). Irriterande med vesicant liknande reaktioner. Erytem, smärta, svullnad har beskrivits, oftast milda och uppstått inom 24 timmar efter extravasering. Fallrapport om fördöjd nekros finns. Fallrapport har enbart haft högläge, smärtstillande och sårsvård som behandling.		

## Referenser

von Minckwitz et al. Trastuzumab Emtansine for Residual Invasive HER2-Positive Breast Cancer. N Engl J Med. 2019 Feb 14;380(7):617-628.

## Versionsförändringar

### Version 1.7

antiemetika

### Version 1.6

Rättat felskrivning.

### Version 1.5

Förtydligat dosreduktion och lagt länk till FASS. TPK >75 för fortsatta behandlingar i enlighet med FASS.

**Version 1.4**

Administrationsschemat- Länkat kommentarer.

**Version 1.3**

Villkor och kontroller för administration - lagt till information om att infusionsaggregat med filter ska användas.

**Version 1.2**

Länk till referens borttagen.

**Version 1.1**

Behandlingsavsikt Adjuvant och referens tillagd efter rekommendation NT-rådet 2020-03-20.