

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Antitumoral regim - Bröstcancer

Behandlingsavsikt: Adjuvant, Neoadjuvant, Palliativ

**Trastuzumab +Pertuzumab SC (laddningsdos) (Phesgo)**

RegimID: NRB-7174

Kurintervall: 21 dagar

**Ordination/Administrering**

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
Pertuzumab, Trastuzumab Subkutan injektion 1200/600 mg	x1																					

Lågemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

**Villkor och kontroller för administration**

Ökad beredskap för anafylaktisk reaktion. Observation av patienten 30 min efter injektion.

Injektionsstället ska alterneras enbart mellan vänster och höger lår. Nya injektioner ska ges minst 2,5 cm från föregående ställe på frisk hud och aldrig på områden där huden är röd, har blåmärken, är öm eller hård.

**Anvisningar för ordination**

Regelbunden monitorering av vänsterkammarfunktion (var 3:e månad adjuvant och 1 ggr/år palliativt).

**Dosjustering rekommendation**

Phesgo dosreduceras inte. Uppehåll i behandlingen kan behövas vid toxicitet. Se FASS.

(https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&amp;nplId=20200111000010)

Efter uppehåll mer än 6 veckor, starta med laddningsdos igen.

**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign****1. Pertuzumab, Trastuzumab \_\_\_\_\_ mg**

Ges subkutant

(8 minuters injektion)

**2. Observation 30 minuter efter avslutad injektion**

.....