

Datum: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Läkare: \_\_\_\_\_

Kur nr: \_\_\_\_\_

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

Längd (cm): \_\_\_\_\_

Vikt (kg): \_\_\_\_\_

Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

## Antitumoral regim - Bröstcancer

RegimID: NRB-1188

**Vinorelbin po 60 veckovis 21 dagar kontinuerlig**

Diagnoskod: C50

Kurintervall: 21 dagar

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Ny kur dag 22
Vinorelbin Peroral kapsel 60 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)	x1							x1							x1							

Medelemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

Vinorelbin Peroral kapsel

Dosering i förhållande till måltid: Tas i samband med måltid

**Anvisningar för ordination**

Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila och leverstatus. LPK &gt;2,5, neutrofila &gt;1,5, TPK &gt;100 för start. Uppmärksamhet på bilirubin.

Antiemetika ordineras, t.ex tablett Ondansetron 8 mg ca 1 timme före Vinorelbin.

**Antiemetika**

Förslag enligt stöddokument:

<https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/lakemedelsregimer/antiemetika/ae-steg-2a-1-dag.-ondansetron-olanzapin>**DAG 1** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Tablett/Injektion Antiemetika \_\_\_\_\_

2. **Vinorelbin** \_\_\_\_\_ mg  
Ges peroralt \_\_\_\_\_**DAG 8** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Tablett/Injektion Antiemetika \_\_\_\_\_

2. **Vinorelbin** \_\_\_\_\_ mg  
Ges peroralt \_\_\_\_\_

**DAG 15** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

1. Tablett/Injektion Antiemetika

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. **Vinorelbin** \_\_\_\_\_ **mg**

Ges peroralt

\_\_\_\_\_ .....

\_\_\_\_\_