

Datum: _____

Läkare: _____

Kur nr: _____

Längd (cm): _____

Yta (m²): _____

Vikt (kg): _____

Aktuellt GFR: _____

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. & fax, kundnr

Antitumoral regim - Huvud- och halscancer

Docetaxel veckovis konkomitant med strålbehandling

Kurintervall: 7 dagar

Behandlingsavsikt: Kurativ

RegimID: NRB-9831

Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4	5	6	7	Ny kur dag 8
Docetaxel (vattenfri) Intravenös infusion 15 mg/m ²	x1							

Lågemetogen.
Antiemetika enligt lokal instruktion. _____

Villkor och kontroller för administration
Ökad beredskap för överkänslighetsreaktion, störst risk vid kur 2.
Kontrollera att patienten tagit sin premedicinering.

Anvisningar för ordination
Blod- och leverstatus. För behandlingsstart neutrofila >1,5 och TPK>100. Kontroll av perifer neuropati.
Premedicinering med kortison motsvarande tablett Betametason:
Behandlingsdagen tas/ges tablett Betametason 8 mg, minst en timme före behandling.

Dosjustering rekommendation
Hematologisk toxicitet
Neutrofila 0,5-1,0 och/eller TPK 75-99 ge 75 % av dosen
Neutrofila < 0,5 och/eller TPK <75 - behandlingen skjuts upp en vecka.

Antiemetika
Ingen ytterligare profylaktiskt antiemetika då kortison ingår i premedicinering.

DAG 1

Datum_____

Beställs till kl_____

Avvakta ja nej

Inf. tid

Klockan

Ssk. sign

Läk. sign

1. Kontrollera att patienten tagit sin premedicinering

.....

2. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet

.....

3. Docetaxel (vattenfri) _____ mg
i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
Ges intravenöst under 30 min.

30 min.
